

# SF1669 Matematisk och numerisk analys II

## Sextonde föreläsningen

Mats Boij

Institutionen för matematik  
KTH

23 februari 2015

# Repetition

- ▶ **Trippelintegraler**  $\iiint_K f(x, y, z) dx dy dz$  ges av Riemannsummor.
- ▶ Variabelbyte med beloppet av **Jacobianen**,  $\left| \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(s, t, u)} \right|$ .
- ▶ Vid cylinderkoordinater är  $dx dy dz = r dr d\theta dz$ .
- ▶ Vid sfäriska koordinater är  $dx dy dz = r^2 \sin \phi dr d\phi d\theta$ .
- ▶ Volymen av en kropp  $K$  ges av

$$V = \iiint_K 1 dx dy dz.$$

- ▶ Arean av en yta  $\mathbf{r}(s, t)$  ges av

$$A = \iint_D \left| \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial s} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial t} \right| ds dt.$$

# Tröghetsmoment

Rörelseenergin för en stelkropp  $K$  under rotation med en vinkelhastighet  $\omega$  ges av  $J\omega^2/2$  där

$$J = \iiint_K \rho(x, y, z) D^2(x, y, z) dx dy dz$$

där  $D(x, y, z)$  är avståndet från  $(x, y, z)$  till rotationsaxeln.


Exempel (Tentamen  
2013-01-10, Uppgift 3)

Kroppen  $K$  ges av

$$x^2 + y^2 \leq z \leq 2 - x^2 - y^2.$$

Beräkna tröghetsmomentet m.a.p.  $z$ -axeln, dvs

$$\iiint_K (x^2 + y^2) dx dy dz$$



# Tröghetsmoment


Exempel (Tentamen  
2013-01-10, Uppgift 3)

Kroppen  $K$  ges av

$$x^2 + y^2 \leq z \leq 2 - x^2 - y^2.$$

Beräkna tröghetsmomentet  
m.a.p.  $z$ -axeln, dvs

$$\iiint_K (x^2 + y^2) dx dy dz$$



## Fråga

Var börjar vi?

- A. Beskriva kroppen
- B. Välja koordinater (rektangulära, sfäriska eller cylindriska)
- C. Välja integrationsmetod

# Tyngdpunkt

Tyngdpunkten, eller masscentrum, hos en kropp  $K$  ges av

$$(x_c, y_c, z_c) = \frac{1}{m} \iiint_K (x, y, z) \rho(x, y, z) dx dy dz,$$


där  $m$  är kroppens massa.

Exempel (Tentamen  
2013-08-22, Uppgift 6)

Låt  $K$  vara ett homogent halvklot som har radie  $R$ , medelpunkt i origo och ligger över  $xy$ -planet. Beräkna  $z$ -koordinaten för kroppen  $K$ :s masscentrum, dvs

$$\frac{1}{V} \iiint_K z dx dy dz$$

där  $V$  är volymen av  $K$ .



# Medelvärden


Vi kan beräkna medelvärden över områden genom

$$m_K(f) = \frac{\iiint_K f(x, y, z) dx dy dz}{\iiint_K 1 dx dy dz}$$

i rummet eller

$$m_D(f) = \frac{\iint_D f(x, y) dx dy}{\iint_D 1 dx dy}$$

i planet.



## Exempel


Bestäm det genomsnittliga avståndet till origo från punkter i rektangeln  $0 \leq x \leq 1$ ,  $1 \leq y \leq 3$ , dvs beräkna

$$\frac{1}{2} \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy.$$

# Vektorfält

## Definition


Ett **vektorfält** på ett område  $D$  i  $\mathbb{R}^n$  är en funktion  $\mathbf{F}: D \rightarrow \mathbb{R}^n$ .



Figur : Matlab ritar ut vektorfält med quiver

# Fältlinjer

Vektorfältets **fältlinjer** har vektorfältet som tangentvektorer.



# Konservativa vektorfält och potentialer

## Definition

Ett vektorfält  $\mathbf{F}$  är **konservativt** om  $\mathbf{F} = \nabla f$  för någon **potential**  $f$ .

## Sats


Om  $\mathbf{F}(x, y) = \nabla f(x, y) = (P(x, y), Q(x, y))$  så gäller  $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ .

## Fråga

Vad av följande stämmer?

- A. Alla vektorfält med  $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$  är konservativa.
- B. Det kan finnas vektorfält med  $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$  som inte är konservativa.
- C. Båda ovanstående stämmer.
- D. Inget av dem stämmer.


Ett exempel på icke-konservativt fält med  $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$



# Ekvipotentiallinjer

## Definition

För ett konservativt vektorfält  $\mathbf{F} = \nabla f$  ges **ekvipotentiallinjerna** av nivåkurvorna för potentialen  $f$ .



# Fält- och ekvipotentiallinjer

## Sats

*Fältlinjer och ekvipotentiallinjer är vinkelräta mot varandra.*

