

**SF1669 Matematisk och numerisk analys II**  
**Lösningsförslag till tentamen 2018-08-16**

DEL A


1. Givet funktionen

$$f(x, y) = \ln(x^2 - y^2).$$

- a) Bestäm definitionsmängden  $D$  för  $f$ . Rita även en bild av  $D$ . (1 p)
- b) Bestäm huruvida  $D$  är öppen, sluten eller ingetdera. (1 p)
- c) Har  $f$  några kritiska punkter i definitionsmängden  $D$ ? (1 p)
- d) Beräkna  $f_{xy}(1, 0)$ . (1 p)

**Lösningförslag.** a) Logaritmen  $\ln t$  är definierad enbart för  $t > 0$ . Dvs funktionen  $f$  är definierad då  $x^2 - y^2 > 0$ :

$$D = \{(x, y) : x^2 - y^2 > 0\} = \{(x, y) : |x| > |y|\}.$$



b) Området är öppet då den ges av  $\{|x| > |y|\}$  med randen  $\{|x| = |y|\}$  som inte tillhör området.

c) Derivering ger

$$f_x = \frac{2x}{x^2 - y^2}, \quad f_y = \frac{-2y}{x^2 - y^2}$$

och med  $(f_x, f_y) \neq (0, 0)$  då  $(x, y) \neq (0, 0)$ . Observera att i origo är gradienten inte definierad, samt att origo tillhör inte definitionsmängden. Därför saknar  $f$  kritiska punkter i sitt definitionsmängd.

d)

$$f_{xy} = \frac{4yx}{(x^2 - y^2)^2}.$$

Vi har  $f_{xy}(1, 0) = 0$ .

e) Vi har  $\nabla f(1, 0) = (2, 0)$ , och  $\mathbf{u} = (1, 0)$  ger en enhetsvektor i den ritkningen. Vi får således  $D_{\mathbf{u}}f(1, 0) = (2, 0) \cdot (1, 0) = 2$ .

- Svar.** a)  $\{(x, y) : x^2 > y^2\}$ .  
b) öppen mängd.  
c) Inga kritiska punkter i  $D$ .  
d)  $f_{xy}(1, 0) = 0$ .  
e)  $D_{\mathbf{u}}f(1, 0) = (2, 0) \cdot (1, 0) = 2$ .

2. För reella konstanter  $a, b$  betrakta vektorfältet

$$\mathbf{F} = (ay^3 + 3x^2y, 3y^2x + bx^3).$$

(a) För vilka värden på konstanterna  $a, b$  finns det en potentialfunktion till  $\mathbf{F}$ ? **(2 p)**

(b) För  $a = b = 1$  beräkna linjeintegralen  $\int_{\gamma_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$  där  $\gamma_1$  är en godtycklig kurva från  $(0, 2)$  till  $(1, 1)$ . **(2 p)**

**Lösningförslag.**

(a) Vektorfältet  $\mathbf{F} = (P, Q)$  är konservativt om  $P_y = Q_x$ . Eftersom

$$P_y = 3ay^2 + 3x^2, \quad Q_x = 3y^2 + 3bx^2$$

måste vi ha  $a = b = 1$  för att få  $P_y = Q_x$ . Därför är fältet konservativt enbart då  $a = b = 1$ .

(b) Eftersom fältet är konservativt för  $a = b = 1$ , har vi då en potentialfunktion som kan räknas med integration

$$\begin{aligned} f_x = y^3 + 3x^2y &\rightarrow f = xy^3 + x^3y + g(y) \rightarrow \\ f_y = 3xy^2 + x^3 + g'(y) = 3y^2x + x^3 &\rightarrow g = \text{konstant} = K \rightarrow f = xy^3 + x^3y + K. \end{aligned}$$

Vi har

$$\int_{\gamma_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = f(1, 1) - f(0, 2) = 2.$$

**Svar.** a)  $a = b = 1$ .

b)  $\int_{\gamma_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 2$ .

3. Antag att kateterna  $a, b$  i en rätvinklig triangel är givna som  $a = 8 \pm 0.03$  och  $b = 6 \pm 0.01$ .  
Uppskatta en felgräns för triangelns hypotenusan. **(4 p)**

**Lösningförslag.** Pythagoras sats ger hypotenusan  $c$  som funktion av  $a$  och  $b$ ,

$$c(a, b) = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Enligt felfortplantningsformeln ges felgränsen  $E_c$  i  $c$  av

$$\begin{aligned} E_c &\approx \left| \frac{\partial c(\tilde{a}, \tilde{b})}{\partial a} \right| E_a + \left| \frac{\partial c(\tilde{a}, \tilde{b})}{\partial b} \right| E_b = \left| \frac{\tilde{a}}{\sqrt{\tilde{a}^2 + \tilde{b}^2}} \right| E_a + \left| \frac{\tilde{b}}{\sqrt{\tilde{a}^2 + \tilde{b}^2}} \right| E_b \\ &= \frac{\tilde{a}E_a + \tilde{b}E_b}{\sqrt{\tilde{a}^2 + \tilde{b}^2}} = \frac{8 \times 0.03 + 6 \times 0.01}{\sqrt{8^2 + 6^2}} = \frac{0.24 + 0.06}{\sqrt{100}} \\ &= \frac{0.3}{10} = 0.03. \end{aligned}$$

**Svar.**

## DEL B

4. Låt

$$f(x, y) = y^3 \sqrt{1 - x^2 - y^2}$$

och  $D$  vara det område i planet som ges av

$$D = \{(x, y) : x \geq 0, \quad x^2 + y^2 \leq 1\}.$$

- (a) Bestäm största värdet för  $f$  över området  $D$ . (2 p)  
 (b) Beräkna integralen (2 p)

$$\iint_D y^3 \sqrt{1 - x^2 - y^2} \, dx dy.$$

**Lösningförslag.**

- a) Största värdet sökes bland tre möjliga punkter: kritiska punkter, singulära punkter, randpunkter.

Kritiska punkter ges av

$$\nabla f = \left( \frac{-x}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}}, \frac{3y^2 - 3y^2x^2 - 4y^4}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}} \right) = (0, 0)$$

som ger att  $x = 0$ , som är på randen. Observera att betraktar man enbart de inre kritiska punkterna, då randpunkterna ska studeras separat. Därför har vi inga kritiska punkter i det inre delen av  $D$ .

Funktionen  $f$  har heller inga singulära punkter i det inre delen av  $D$ .Nu återstår det att studera randpunkter. På cirkeln  $x^2 + y^2 = 1$  har vi  $f = 0$ .på  $\{x = 0\}$  har vi  $g(y) = f(0, y) = y^3 \sqrt{1 - y^2}$  för  $-1 \leq y \leq 1$ . Derivering ger

$$\frac{3y^2 - 4y^4}{\sqrt{1 - y^2}} = 0 \quad \rightarrow \quad 3y^2 - 4y^4 = 0 \quad \rightarrow \quad y = 0, \quad y = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

För  $y = 0$  har vi  $g(0) = f(0, 0) = 0$ . För  $y = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$  har vi

$$g\left(\pm \frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \pm \frac{3\sqrt{3}}{16}$$

som medför att största värdet är  $\frac{3\sqrt{3}}{16}$ .

- b) Eftersom området  $D$  är symmetrisk m.a.p.  $y$ -axeln, och att  $f$  är en udda funktion i  $y$ -variabel  $f(x, -y) = -f(x, y)$  så måste integralen vara noll. Mer exakt med  $D_+ = \{(x, y) \in D : y > 0\}$ ,  $D_- = \{(x, y) \in D : y < 0\}$  får vi

$$\begin{aligned} \iint_D f(x, y) \, dx dy &= \iint_{D_+} f(x, y) \, dx dy + \iint_{D_-} f(x, y) \, dx dy = \\ &= \iint_{D_+} f(x, y) \, dx dy + \iint_{D_+} f(x, -y) \, dx dy \end{aligned}$$

$$\iint_{D_+} f(x, y) \, dx dy - \iint_{D_+} f(x, y) \, dx dy = 0.$$

**Svar.** a)  $\frac{3\sqrt{3}}{16}$

b)  $\iint_D y^3 \sqrt{1 - x^2 - y^2} \, dx dy = 0$

5. Låt

$$D = \{(x, y, z) : \sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq \sqrt{1 - x^2 - y^2}\}.$$

- (a) Skriv de rektangulära  $(x, y, z)$ -koordinaterna som funktioner av de sfäriska koordinater  $R, \theta, \phi$ . Glöm ej intervallen för de nya koordinater. **(1 p)**
- (b) Ange Jacobimatrisen för koordinatbytet från rektangulära  $(x, y, z)$ -koordinater till sfäriska koordinater  $R, \theta, \phi$ . **(1 p)**
- (c) Beräkna trippelintegralen  $\iiint_D z \, dV$ . **(2 p)**

**Lösningförslag.**

- (a) Sfriska koordinater ges av

$$x = R \cos \theta \sin \phi, \quad y = R \sin \theta \sin \phi, \quad z = R \cos \phi$$

där

$$R \geq 0, \quad 0 \leq \theta < 2\pi \quad 0 \leq \phi \leq \pi.$$

- (b) Jacobimatrisen ges av

$$\begin{bmatrix} x_R & x_\theta & x_\phi \\ y_R & y_\theta & y_\phi \\ z_R & z_\theta & z_\phi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta \sin \phi & -R \sin \theta \sin \phi & R \cos \theta \cos \phi \\ \sin \theta \sin \phi & -R \cos \theta \sin \phi & R \sin \theta \cos \phi \\ \cos \phi & 0 & -R \sin \phi \end{bmatrix}$$

- (c) Området kan nu beskrivas som

$$D = \{\sqrt{\sin^2 \phi} \leq \cos \phi, \quad R \leq 1\}.$$

Detta medför att  $\cos \phi \geq 0$ , och att  $\sin \phi \leq \cos \phi$ , dvs  $\tan \phi \leq 1$ , eller  $0 \leq \phi \leq \pi/4$ .  
(Observera att från början har vi  $0 \leq \phi \leq \pi$ .)

Det borde också noteras att området är oberoende av  $\theta$  så att  $0 \leq \theta \leq 2\pi$ .

- (d) Med  $dV = R \sin \phi dR d\theta d\phi$  kan integralen  $I$  skrivas som

$$I = \int \int \int_D z dV = \int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_0^{\pi/4} R^3 \cos \phi \sin \phi dR d\theta d\phi = \frac{\pi}{8}.$$

**Svar.** Se ovan

6. En numerisk integrationsmetod ger resultatet  $I_h$  när steglängden är  $h$ . För successivt halverade värden på  $h$  ges

$$I_h = 1.6926479311,$$

$$I_{h/2} = 1.6926505354,$$

$$I_{h/4} = 1.6926506955,$$

$$I_{h/8} = 1.6926507054.$$

Felet antas bero snällt på steglängden.

(a) Vad är noggrannhetsordningen? (2 p)

(b) Ge ett så bra närmevärde som möjligt till felet i  $I_{h/8}$ . (2 p)

**Lösningförslag.** När felet beror snällt på steglängden gäller för små  $h$  att

$$I_h \approx I + ch^p.$$

där  $p$  är noggrannhetsordningen och  $c$  är någon konstant.

(a) Från ovan har vi

$$I_h - I_{h/2} = I_h - I - (I_{h/2} - I) \approx ch^p - ch^p 2^{-p} = ch^p(1 - 2^{-p}).$$

Det ger

$$\frac{I_h - I_{h/2}}{I_{h/2} - I_{h/4}} \approx \frac{ch^p(1 - 2^{-p})}{ch^p 2^{-p}(1 - 2^{-p})} = 2^p.$$

Vi beräknar  $I_{h/2} - I_{h/4} \approx -16.0 \cdot 10^{-8}$  och  $I_{h/4} - I_{h/8} \approx -0.99 \cdot 10^{-8}$ . Det ger

$$2^p \approx \frac{16.0}{0.99} \approx 16 = 2^4.$$

Noggrannhetsordningen är därför 4.

(b) Givet  $p = 4$  kan vi också beräkna felet  $e_h = I_h - I \approx ch^p$ . Vi har då

$$I_{2h} - I_h \approx ch^p(2^p - 1) = e_h(2^p - 1) = 15e_h.$$

Med siffrorna ovan får vi

$$e_{h/8} \approx \frac{1}{15}(I_{h/4} - I_{h/8}) = \frac{-0.99}{15} \cdot 10^{-8} \approx -6.7 \cdot 10^{-10}.$$



## DEL C

## 7. Givet ekvationssystemet

$$\begin{cases} xyz + \sin(x + y + z) + x(y + z) & = 1 \\ \cos(xyz) - e^{xyz} + x + y & = \pi/2 \end{cases}$$

(a) Visa att ekvationssystemet har en lösning på formen

$$y = y(x), \quad z = z(x)$$

i en omgivning av punkten  $(\pi/2, 0, 0)$ .**(2 p)**(b) Är  $z(x)$  växande eller avtagande som funktion av  $x$  i en omgivning av  $x = \pi/2$ .**(2 p)****Lösningsförslag.** a) Sätt

$$\begin{cases} F(x, y, z) = xyz + \sin(x + y + z) + x(y + z) - 1 & = 0 \\ G(x, y, z) = \cos(xyz) - e^{xyz} + x + y - \pi/2 & = 0. \end{cases}$$

Vi har att  $(\pi/2, 0, 0)$  satisfierar ekvationen. För att ekvationen ska ha den sökta lösningen behövs enligt implicita funktionssatsen att i den aktuella punkten  $(\pi/2, 0, 0)$ 

$$\det \begin{bmatrix} F_y & F_z \\ G_y & G_z \end{bmatrix} \neq 0$$

Vi får då

$$\begin{aligned} F_y &= xz + \cos(x + y + z) + x & \rightarrow & F_y(\pi/2, 0, 0) = \pi/2 \\ F_z &= xy + \cos(x + y + z) + x & \rightarrow & F_z(\pi/2, 0, 0) = \pi/2 \\ G_y &= -(xz) \sin xyz - (xz)e^{xyz} + 1 & \rightarrow & G_y(\pi/2, 0, 0) = 1 \\ G_z &= -(xy) \sin xyz - (xy)e^{xyz} & \rightarrow & G_z(\pi/2, 0, 0) = 0 \end{aligned}$$

som ger

$$\det \begin{bmatrix} \pi/2 & \pi/2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = -\pi/2 \neq 0.$$

Därför enligt implicita funktionssatsen kan  $y$  och  $z$  lösas ut i termer av  $x$ .b) För att bestämma  $z_x$  deriverar vi båda ekvationerna m.a.p.  $x$  och löser ut  $z_x(\pi/2, 0, 0)$ 

$$\begin{cases} yz + xy_x z + xyz_x + (1 + y_x + z_x) \cos(x + y + z) + (y + z) + x(y_x + z_x) & = 0 \\ -(yz + xy_x z + xyz_x) \sin(xyz) - (yz + xy_x z + xyz_x) e^{xyz} + 1 + y_x & = 0. \end{cases}$$

I punkten  $(\pi/2, 0, 0)$  får vi

$$\begin{cases} \frac{\pi}{2}(y_x + z_x) & = 0, \\ 1 + y_x & = 0, \end{cases}$$

som ger  $y_x = -1$  och  $z_x = 1$ . Dvs  $z$  är växande.

**Svar.** a) Se ovan

b)  $z = z(x)$  är växande kring  $x = \pi/2$ .

8. Låt  $C_r$  vara en cirkel med radien  $r$  och centrum i origo, tagen ett varv i positiv led. Sätt

$$I(r) = \int_{C_r} \frac{(y-1)dx - (x-1)dy}{(x-1)^2 + (y-1)^2}.$$

Beräkna  $I(r)$  för alla  $r \neq \sqrt{2}$ .

(4 p)

**Lösningförslag.** Sätt  $F_1 = \frac{y-1}{(x-1)^2 + (y-1)^2}$ ,  $F_2 = -\frac{x-1}{(x-1)^2 + (y-1)^2}$ . Då gäller, om  $(x, y) \neq (1, 1)$

$$\partial_y F_1 = \frac{(x-1)^2 - (y-1)^2}{((x-1)^2 + (y-1)^2)^2} = \partial_x F_2.$$

Eftersom  $F_1, F_2$  är  $C^1$  innanför  $C_r$ , då  $r < \sqrt{2}$ , kan vi använda Greens sats för  $r < \sqrt{2}$ . Observera att för  $r = \sqrt{2}$  är integralen inte definierad i vanlig mening. För  $r < \sqrt{2}$  får vi

$$I(r) = \int_{C_r} F_1 dx + F_2 dy = \iint_{x^2 + y^2 < r^2} (\partial_x F_2 - \partial_y F_1) dx dy = 0.$$

Låt nu  $r > \sqrt{2}$ , och ta en ny cirkel  $\gamma_\epsilon$  runt punkten  $(1, 1)$  med liten radie  $\epsilon < r - \sqrt{2}$  så att  $\gamma_\epsilon$  är innanför  $C_r$ . Vi parametriserar  $\gamma_\epsilon$  i negativ led (så att den är i positiv led för området utanför). Vi har då

$$I(r) = \int_{C_r \cup \gamma_\epsilon} (F_1 dx + F_2 dy) - \int_{\gamma_\epsilon} (F_1 dx + F_2 dy).$$

Låt

$$D_{r,\epsilon} = \{(x, y) : x^2 + y^2 < r^2, (x-1)^2 + (y-1)^2 > \epsilon^2\}.$$

Applicera nu Greens sats på den första integralen i  $D_{r,\epsilon}$  och använd att vektorfältet är konservativt så att den första integralen blir noll

$$\begin{aligned} I(r) &= \int_{C_r \cup \gamma_\epsilon} (F_1 dx + F_2 dy) - \int_{\gamma_\epsilon} (F_1 dx + F_2 dy) = \\ &= \iint_{D_{r,\epsilon}} (\partial_x F_2 - \partial_y F_1) dx dy - \int_{\gamma_\epsilon} (F_1 dx + F_2 dy) = 0 - \int_{\gamma_\epsilon} (F_1 dx + F_2 dy). \end{aligned}$$

Parametrisera nu kurvan  $\gamma_\epsilon$ , enligt

$$x = 1 + \epsilon \cos \theta, \quad y = 1 + \epsilon \sin \theta \quad \theta : 2\pi \rightarrow 0.$$

Vi får

$$dx = -\epsilon \sin \theta d\theta, \quad dy = \epsilon \cos \theta d\theta$$

och

$$\int_{\gamma_\epsilon} (F_1 dx + F_2 dy) = \int_{2\pi}^0 (-\sin^2 \theta - \cos^2 \theta) d\theta = -\int_{2\pi}^0 d\theta = 2\pi.$$

Integralen blir då  $I(r) = -2\pi$ .

**Svar.** För  $r < \sqrt{2}$  har vi  $I(r) = 0$  och för  $r > \sqrt{2}$  har vi  $I(r) = -2\pi$

## 9. Givet ekvationssystemet

$$\sin(x) = y + z + 1,$$

$$\sin(y) = x + z + 2,$$

$$\sin(z) = x + y + 3.$$

Newton methods för system ska användas för att hitta en lösning nära  $(x, y, z) = (-2, -1, -1/2)$ . Skriv ett Matlabprogram som gör detta. Felen i  $x$ -,  $y$ - och  $z$ -värdena ska alla vara mindre än  $10^{-10}$ . **(4 p)**

**Lösningförslag.** Startgissningen väljs till  $(x, y, z) = (-2, -1, -1/2)$  eftersom roten ligger nära denna punkt. Iterationerna avbryts när största förändringen i de tre komponenterna,  $\max(\text{abs}(DX))$ , är mindre än  $10^{-10}$ . Matlab-programmet kan tex skrivas:

```
F = @(X) [sin(X(1))-X(2)-X(3)-1; sin(X(2))-X(1)-X(3)-2; sin(X(3))-X(2)-X(1)-3];
```

```
J = @(X) [cos(X(1)) -1 -1; -1 cos(X(2)) -1; -1 -1 cos(X(3))];
```

```
X=[-2;-1;-1/2];
```

```
DX = [1; 1; 1];
```

```
while max(abs(DX))>tol DX =-J(X) (X);
```

```
X = X + DX;
```

```
end
```

```
disp(X)
```

Lösningen blir

$$x \approx -2.367188800852147, \quad y \approx -1.152639777174218, \quad z \approx -0.546650273717403$$


---