



Tekniskt basår

Matematik I



Kursbunt

2016-08-16

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 Implikation och ekvivalens	3
2 Rätalinjens ekvation och linjära ekvationssystem.....	4
3 Mer om vektorer	12
4 Absolutbelopp.....	16
5 Formler	21
6 Area- och volymskala.....	23
<i>Överkurs. Mer om absolutbelopp och ekvationer.....</i>	<i>27</i>
Facit	29

1 IMPLIKATION OCH EKVIVALENS¹

I matematisk argumentation används ibland de logiska symbolerna \Leftrightarrow och \Rightarrow . Pilarna kan skrivas mellan två påståenden P och Q .

Ekvivalenspil Dubbelpilen \Leftrightarrow är en *ekvivalenspil*. Den uttalas "är ekvivalent med" eller "om och endast om".

$$P \Leftrightarrow Q$$

Om påståendet före pilen är sant, så är också påståendet efter pilen sant. Och om påståendet efter pilen är sant, så är också påståendet före pilen sant.

Exempel 1 $x + 3 = 10 \Leftrightarrow x = 7$

Exempel 2 "Triangeln ABC är likbent." \Leftrightarrow
"Två av vinklarna i triangeln ABC är lika."

Implikationspil Enkelpilen är en implikationspil. Den uttalas "implicerar" eller "medför".
 $P \Rightarrow Q$

Man säger att det första påståendet *medför* det andra, eller att det andra påståendet *följer av* det första. Omvändningen gäller dock inte.

Exempel 3 $x - 3 = 0 \Rightarrow x^2 = 9$
Omvändningen gäller ej. Den andra ekvationen har två lösningar ($x = \pm 3$) medan den första endast har en lösning ($x = 3$).

Exempel 4 "ABCD är en kvadrat." \Rightarrow "ABCD är en fyrhörning."
Omvändningen gäller ej. Det finns fyrhörningar som inte är kvadrater.

Exempel 5 "Lotta är svensk medborgare." \Rightarrow "Lotta är EU – medborgare."
Omvändningen gäller ej. Det finns EU-medborgare som inte är svenska medborgare.

101. Vilken av symbolerna \Leftrightarrow eller \Rightarrow ska stå i rutan? Motivera ditt svar.

- a) Triangel är liksidig.
Triangelns vinklar är lika.
- b) $2x + 3 = 19$ $x = 8$
- c) a är ett naturligt tal. a är ett heltal.
- d) Vinkel $v = 50^\circ$. Vinkel v är spetsig.
- e) Cirkelns radie är 5 cm.
Cirkelns diameter är 10 cm.
- f) Robin är 17 år. Robin är en tonåring.

102. Ge exempel på ett påstående som kan stå efter pilen.

- a) $3x + 5 = 17 \Leftrightarrow$
- b) Vinkel $v = 100^\circ \Rightarrow$
- c) ABCD är en rektangel. \Rightarrow
- d) $x^2 = 25 \Leftrightarrow$
- e) Vinkelsumma i en polygon är $540^\circ \Leftrightarrow$
- f) $x < 0 \Leftrightarrow$
- g) Djuret är en fisk. \Rightarrow
- h) Heltalet a är delbart med 3. \Leftrightarrow

¹ Sid 4 något omarbetat från: M. Karlsson, E. Högsborn, Å. Lundbom (2011), *Matematik 5000 kurs 1C*, Natur och Kultur läromedel, ISBN 978-91-27-42160-8

2 RÄTA LINJENS EKVATION OCH² LINJÄRA EKVATIONSSYSTEM

Räta linjens ekvation En funktion $y = f(x)$ vars graf är en rät linje är en linjär funktion. $f(x)$ är en förstaordningens polynom $kx + m$, där konstanterna k och m avgör det linjära sambandet mellan variablerna x och y .

Riktningskoefficient Ekvationen $y = kx + m$ beskriver den räta linjens ekvation. k kallas *riktningskoefficient* och betecknar lutningen på linjen.

Ett positivt k -värde ger en linje som lutar snett uppåt åt höger i koordinatsystemet, vilket innebär att funktionsvärdet blir större ju större värdet blir på den oberoende variabeln.

Ett negativt k -värde ger en linje som lutar snett neråt åt höger, att funktionsvärdet blir mindre ju större värdet blir på den oberoende variabeln.


Om $k = 0$ så har kurvan en horisontell lutning och kurvan ligger därför parallellt med x -axeln.

Intercept


Konstanten m kallas *konstantterm* eller även *intercept* och bestämmer var linjen skär y -axeln. m -värdet motsvarar y -värdet i den punkten där $x = 0$, alltså där linjen skär y -axeln.

Proportionalitet


Om $m = 0$, dvs. om linjen går genom origo, är variablerna x och y proportionella mot varandra.



$$y = 2x + 3; k = 2, m = 3$$



$$y = 3; k = 0, m = 3$$



$$y = -1,5x + 3; k = -1,5, m = 3$$

Riktningskoefficienten k definieras som:

$$k = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

och visar hur många enheter stiger eller faller linjen i y -led för varje enhet vi går framåt i x -led.

²Sid 5-12 något omarbetat från: L. Alfredsson, K. Bråting m.fl. (2012), *Matematik 5000 kurs 2c*, Natur & Kultur läromedel, ISBN 978-91-27-42253-7

Linjärt ekvationssystem

Ett linjärt ekvationssystem består av två eller flera räta linjers ekvationer. Lösningen till ett linjärt ekvationssystem med två ekvationer är ett talpar (x, y) som satisfierar båda ekvationerna. Talparet motsvarar en punkt i koordinatsystemet.

Att talparet (x, y) satisfierar båda ekvationer i ekvationssystemet innebär att punkten (x, y) ligger på de båda räta linjer som representeras av dessa ekvationer. Detta är bara möjligt om punkten (x, y) är de rätta linjernas skärningspunkt.


Exempel 1

(Ej ok på tentamen)

Lös ekvationssystemet $\begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$ grafiskt.

$$\begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = -x + 5 \\ y = x - 1 \end{cases}$$

Vi ritar de båda linjerna i samma koordinatsystem och konstaterar att punkten $(3; 2)$ ligger på båda linjer och därmed är lösningen till ekvationssystemet.



Sammanfattning

Att lösa ett ekvationssystem innebär att man bestämmer ekvationernas gemensamma lösning. Till ett linjärt ekvationssystem med två obekanta finner man lösningen i linjernas skärningspunkt

Grafisk lösningsmetod

En rent grafisk lösning kan vara bra för kontroll och förståelse. OBS! Avläsning av skärningspunkter i graf är inte tillräcklig som motivering på Basårets tentor.

Algebraiska lösningsmetoder

De två algebraiska lösningsmetoderna 'substitutionsmetoden' och 'additionsmetoden' ger direkt den exakta lösningen.

Substitutionsmetoden

Substitutionsmetoden innebär att man ersätter en variabel med ett uttryck som innehåller den andra variabeln

- ① Lös ut en variabel ur den ena ekvationen.
- ② Ersätt variabeln i den andra ekvationen med detta uttryck och lös ekvationen.
- ③ Lösningen till ekvationen sätts in i någon av de ursprungliga ekvationerna, som därefter löses.

Exempel 2:

Lös följande ekvationssystem exakt.

$$\begin{cases} 2x + 3y = 31 \\ 5x - y = 1 \end{cases}$$

- ① Den andra ekvationen ger $y = 5x - 1$.
- ② $y = 5x - 1$ sätts in i den första ekvationen.

$$\begin{aligned} 2x + 3(5x - 1) &= 31 \Rightarrow 2 \Rightarrow 17x = 34 \\ 17x &= 34 \Rightarrow x = \frac{34}{17} = 2 \end{aligned}$$

- ③ $x = 2$ insättes i $y = 5x - 1$ som ger $y = 5 \cdot 2 - 1 = 9$

Svar: Ekvationssystemet har lösningen $\begin{cases} x = 2 \\ y = 9 \end{cases}$

Additionsmetoden

Hur löser vi ett ekvationssystem där vi inte på ett enkelt sätt kan lösa ut en variabel?

Vi undersöker ekvationssystemet

$$\begin{cases} 2x + 3y = 16 & (1) \\ 4x - 3y = 14 & (2) \end{cases}$$

Jämför ekvation (1) och ekvation (2). Koefficienterna framför y har samma siffervärde, men motsatt tecken. Adderar vi ledvis, tar y -termerna ut varandra.

$$\begin{array}{r} \begin{cases} 2x + 3y = 16 \\ + \quad 4x - 3y = 14 \end{cases} \\ \hline 6x + 0 = 30 \\ x = 5 \end{array}$$

$x = 5$ sätts in i en av ekvationerna och ger $y = 2$.

Ekvationssystemet har lösningen $\begin{cases} x = 5 \\ y = 2 \end{cases}$.

Additionsmetoden innebär

- ① Multiplicera den ena eller båda ekvationerna med lämpliga tal så att koefficienterna framför den ena variabeln blir motsatta tal.
- ② Addera ekvationerna ledvis. Vi får då en ekvation med *en* variabel. Lös ekvationen.
- ③ Lösningen till ekvationen sätts in i någon av de ursprungliga ekvationerna, som därefter löses.

Exempel 3

Lös ekvationssystemet med additionsmetoden.

$$\begin{cases} 11x + 3y = 3 & (1) \\ 5x + 2y = 1 & (2) \end{cases}$$

För att lösa ekvationssystemet med additionsmetoden, måste vi först bestämma oss vilken av variablerna x eller y som ska elimineras. Om vi vill få bort variabel y , bör vi multiplicera ekvationen (1) med 2 och ekvation (2) med -3 . Koefficienterna framför y blir motsatta tal, $+6$ och -6 .

$$\textcircled{1} \quad \begin{cases} 2(11x + 3y) = 2 \cdot 3 \\ -3(5x + 2y) = -3 \cdot 1 \end{cases}$$


$$\textcircled{2} \quad + \begin{cases} 22x + 6y = 6 \\ -15x - 6y = -3 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} 7x &= 3 \\ x &= \frac{3}{7} \end{aligned}$$

$$\textcircled{3} \quad \begin{aligned} x = \frac{3}{7} \text{ sätts in i ekvation (2)} \\ 5 \cdot \frac{3}{7} + 2y &= 1 \\ 2y &= -\frac{8}{7} \Rightarrow y = -\frac{4}{7} \end{aligned}$$

Svar: Ekvationssystemet lösning är $\begin{cases} x = \frac{3}{7} \\ y = -\frac{4}{7} \end{cases}$

201. Graferna till ekvationerna i ett ekvationssystem är ritade i figuren.




Avläs ekvationssystemets lösning.

202.

- Rita grafen till $y = x - 1$ och $y = 3 - x$ i samma koordinatsystem.
- Avläs lösningen till ekvationssystemet $\begin{cases} y = x - 1 \\ y = 3 - x \end{cases}$

203.



- Bestäm linjernas ekvationer.
- Vilket ekvationssystem kan lösas grafiskt med hjälp av figuren?
- Avläs lösningen.

204. Lös ekvationssystemet grafiskt.

- $\begin{cases} y = x + 1 \\ y = -2x + 3 \end{cases}$
- $\begin{cases} x - 2y - 1 = 0 \\ 4x - 3y - 6 = 0 \end{cases}$

205. Lös ekvationssystemet

a) $\begin{cases} y = 4x \\ y = x + 15 \end{cases}$

b) $\begin{cases} y = 2x - 8 \\ y = 10 - x \end{cases}$

206. Lös ut variabeln som står i parentesen.

a) $x + 5y = 8$ (x)

b) $7x - y = 3$ (y)

c) $2x + 6y = 10$ (x)

207. Lös ekvationssystemen med substitutionsmetod.


a) $\begin{cases} y = 3x - 2 \\ x + y = 6 \end{cases}$

b) $\begin{cases} 2z + 3x = 5 \\ z = 4 - 2x \end{cases}$

c) $\begin{cases} x - 5y = -3 \\ 4x - 3y = 5 \end{cases}$

d) $\begin{cases} 2x + 3y = 8 \\ 4x + y = -4 \end{cases}$

208.




- a) Ställ upp ett ekvationssystem som beskriver situationen.
b) Bestäm priset på en banan respektive en ost macka.

209. Lösningen till ekvationssystemet

$$\begin{cases} y = 3x + 1 \\ y = 3 - 7x \end{cases}$$

får vi när $y = 8/5$, men vilket värde har x ? Visa att lösningen stämmer.

210.



- a) Ställ upp ett ekvationssystem som beskriver situationen.
b) Bestäm priset på en kopp kaffe respektive en bulle.

211. Bestäm exakt koordinaterna för skärningspunkten mellan de båda rätta linjerna.

a) $2x - y = 2$ och $3x - 2y = 1$

b) $x + 3y + 3 = 0$ och $x - 3y + 2 = 0$

212. Bestäm talet a i ekvationen $5x + 4y = a$ så att uttrycket $5x + 4y - 3$ får värdet 9.

213. Linjerna $y + 2x = 3$, $y = 2x + 1$ och $0,5x - y - 2 = 0$ innesluter en triangel. Bestäm exakt koordinaterna för triangelns hörn.

214. Undersök om linjerna $y - 2x + 3 = 0$, $2x + y - 53 = 0$ och $y - x - 11 = 0$ går genom en och samma punkt.

215. Bestäm talen a och b så att ekvationssystemet $\begin{cases} x - ay = b \\ bx + y = a + 6 \end{cases}$ får lösningen $x = 7$ och $y = 2$.

216. Lös ekvationssystemet med additionsmetoden.

a) $\begin{cases} 2a + b = 25 \\ 7a - b = 11 \end{cases}$

b) $\begin{cases} 11y - 13z = 18 \\ y + 13z = 30 \end{cases}$

$$217. \begin{cases} 3x + 2y = 65 \\ x - 5y = -1 \end{cases}$$

- a) Vad ska du multiplicera den andra ekvationen med för att x -termerna ska "försvinna" vid addition?
 b) Lös ekvationssystemet.

218. Lös ekvationssystemet med additionsmetoden.

$$a) \begin{cases} 2x + 3y = 31 \\ 5x - y = 1 \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} a + 2b - 3 = 0 \\ 7a + 3b - 10 = 0 \end{cases}$$

$$219. \begin{cases} 5x + 4y = 55 \\ 3x - 6y = -9 \end{cases}$$

Vad kan du multiplicera ekvation 1 respektive ekvation 2 med om du vid addition vill eliminera

- a) x - termerna
 b) y - termerna

220. Lös ekvationssystemet med additionsmetoden.

$$a) \begin{cases} 4s + 9t = 43 \\ 3s + 7t = 26 \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} 2x - 8y + 12 = 0 \\ x - 12y + 8 = 0 \end{cases}$$

$$c) \begin{cases} 0,5z + 0,3y - 6 = 0 \\ z - y + 4 = 0 \end{cases}$$

221. Lös ekvationssystemet

$$\begin{cases} 8/s + 4/t = 3 \\ 2/s - 8/t = -3,75 \end{cases}$$

genom att sätta $1/s = x$ och $1/t = y$.

222. Lös ekvationssystemet


$$\begin{cases} x/3 + y/4 = 1/12 \\ x/2 - y/6 = 2/3 \end{cases}$$

223. Lös följande ekvationssystem. Använd substitutionsmetoden eller additionsmetoden

$$a) \begin{cases} 1,2y = 2,0x - 5,4 \\ 0,8x + 1,4y = 7,8 \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} 1000a = 10b - 330 \\ 100a + b = 27 \end{cases}$$

224. José har lämnat tre backar med tillsammans 60 tomglas i pantautomaten och Maria har lämnat en back med 14 tomglas. Bilden visar deras kvitton.



Bestäm panten för en tom back och panten för ett tomglas.

225. Företaget Koori tillverkar två olika sorters bumeranger, en traditionell och en exklusiv variant.



Bumerangerna ska först snidas för hand och sedan målas. En traditionell bumerang tar tre timmar att snida och en timme att måla. En exklusiv bumerang tar fyra timmar att snida och tre timmar att måla.

Under en vecka tillverkades ett antal bumeranger så att det vid veckans slut endast fanns helt färdiga bumeranger. Då hade snidarna arbetat sammanlagt i 150 timmar och målarna sammanlagt i 100 timmar.

Hur många bumeranger tillverkades under denna vecka?

Några speciella ekvationssystem

Exempel

När man löser ett ekvationssystem kan tre fall inträffa:
Att ekvationssystemet har en lösning, saknar lösning eller har obegränsat antal lösningar.
Låt oss titta på tre exempel.

$$1 \begin{cases} y = x + 2 \\ y = 6 - x \end{cases} \quad 2 \begin{cases} y = x + 2 \\ y = x + 5 \end{cases} \quad 3 \begin{cases} y = x + 2 \\ 2y = 2x + 4 \end{cases}$$


Algebraisk lösning

$$\begin{cases} y = x + 2 \\ y = 6 - x \end{cases}$$

$$\begin{aligned} x + 2 &= 6 - x \\ 2x &= 4 \\ x &= 2 \\ y &= 6 - 2 = 4 \end{aligned}$$

Ekvationssystemet har *en*
lösning: $\begin{cases} x = 2 \\ y = 4 \end{cases}$

Grafisk lösning



En skärningspunkt
Detta gäller när linjerna har olika k-värden.

Fall 1

En lösning


Fall 2

Ingen lösning

$$\begin{cases} y = x + 2 \\ y = x + 5 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} x + 2 &= x + 5 \\ 0 &= 3 \text{ (orimligt)} \end{aligned}$$

Ekvationssystemet *saknar*
lösning.



Ingen skärningspunkt.
Detta gäller när linjerna har samma k-värde och olika m-värde.


Fall 3

Oändligt många
lösningar

$$\begin{cases} y = x + 2 \\ 2y = 2x + 4 \end{cases}$$

Vi löser ut y ur den andra ekvationen och får $y = x + 2$
Ekvationerna beskriver samma rätta linje.


Ekvationssystemet har
oändligt många lösningar.



Alla punkter är gemensamma.
Detta gäller när linjerna har samma k-värde och samma m-värde.


226. Ekvationssystemet $\begin{cases} y = 3x + 4 \\ y = kx \end{cases}$ har endast en lösning $x = 2$ och $y = 10$. Bestäm talet k .

227. Linjerna L_1 har ekvationen $y - x = 3$ och L_2 har ekvationen $y - x = -3$



Vad kan du säga om lösningen till ekvationssystemet $\begin{cases} y - x = 3 \\ y - x = -3 \end{cases}$? Motivera ditt svar.

228. Graferna till ekvationerna i ekvationssystemet $\begin{cases} x + y = 2 \\ y = kx + m \end{cases}$ är ritade i figuren.



- a) Bestäm talet k .
 b) Vilken lösning har ekvationssystemet?
 c) Om linjen L_2 roterar runt skärningspunkten så ändras värdet på k och m . Vilket värde har k och m då ekvationssystemet har oändligt många lösningar?
229. $\begin{cases} y = 3x + a \\ y = bx - 7 \end{cases}$
 Undersök antalet lösningar till ekvationssystemet för olika värden på a och b . Motivera dina svar.

230. Lös ekvationssystemet och tolka svaret grafiskt.

- a) $\begin{cases} 2x - y = 3 \\ 2x - y = 5 \end{cases}$
 b) $\begin{cases} 2x - y = 3 \\ 2x + y = 5 \end{cases}$
 c) $\begin{cases} 2x - y = 3 \\ 10x - 5y = 15 \end{cases}$
 d) $\begin{cases} 5x + 2y = 10 \\ 2,5x + y = 1 \end{cases}$

231. Skriv en ekvation som tillsammans med ekvationen $2x + 3y = 5$ ger ett ekvationssystem som

- a) Saknar lösning
 b) Har oändligt många lösningar.

232. $\begin{cases} 2y + x = 6 \\ y - kx = 2 \end{cases}$

För vilka värden på k

- a) saknar ekvationssystemet lösning
 b) har ekvationssystemet en lösning
 c) har ekvationssystemet en lösning i 1:a kvadranten ($x, y > 0$)?

233. För vilka värden på talet a har ekvationssystemet $\begin{cases} 4x - 2y = 5 \\ ay - 6x = -1,5 \end{cases}$ En enda lösning?

234. Lös ekvationssystemet $\begin{cases} ax + 12y = 11 \\ 69x + 25y = 27 \end{cases}$ Exakt, för $a = 33$ och sedan för $a = 33,1$. Förklara geometriskt varför en liten ändring i koefficienten a i detta fall ger en stor ändring i lösningen.

3 MER OM VEKTORER³

Basvektorer


En vektor kan alltid delas upp i komponenter längs två givna riktningar. Dessa riktningar ges i planet av två vektorer, \vec{e}_x och \vec{e}_y , dvs. i x - respektive y -riktning. Om de väljs så att de inte är parallella sägs vektorparet vara *basvektorer*, de utgör en bas. Om de dessutom är vinkelräta och har längden ett utgör de en så kallad ON-bas, ett ON-system.

ON-system

ON betyder *ortonormal*, *orto* från *ortogonal* (vinkelrät) och *normerat* därför att basvektorerna har längden ett.

Varje vektor kan alltid skrivas som en summa av \vec{e}_x och \vec{e}_y . I figuren nedan blir $\vec{u} = 3\vec{e}_x + 2\vec{e}_y$ eller om man underförstår basvektorerna, $\vec{u} = (3, 2)$. Man säger att vektorn \vec{u} har koordinaterna $(3, 2)$. Komponenterna till vektor \vec{u} är $3\vec{e}_x$ och $2\vec{e}_y$.

Tyvärr används samma beteckning för en punkt. I figuren nedan gäller att vektorn $\vec{u} = (3, 2)$ och punkten $P = (1, 2)$. Om inga missförstånd kan ske, använd detta betecknings sätt, annars bör du skriva $\vec{u} = 3\vec{e}_x + 2\vec{e}_y$



Parallella vektorer

Två vektorer \vec{u} och \vec{v} är parallella om och endast om $\vec{u} = k \cdot \vec{v}$, där k är en konstant.

Exempel 1

Bestäm det reella talet t så att vektor $\vec{u} = (3, 1) + t(1, 2)$ blir parallell med vektor $(1, 1)$.

Lösning:


$(3, 1) + t(1, 2) = (3 + t, 1 + 2t)$ ska vara parallell med $(1, 1)$. Det ska alltså finnas ett tal k , sådant att

$$k(1, 1) = (3 + t, 1 + 2t)$$

Denna vektorekvation ger upphov till ekvationssystemet:

$$\begin{cases} 3 + t = k \\ 1 + 2t = k \end{cases}$$

som har lösningen



³ Sid 13-16 något omarbetat från: L. A. Callenberg (2006), *Matematik Breddning*, Studentlitteratur AB, ISBN 91-44-04635-9

$$\begin{cases} t = 2 \\ k = 5 \end{cases}$$


Det reella talet $t = 2$ gör att

$$(3, 1) + t(1, 2) = (3, 1) + 2(1, 2) = (3, 1) + (2, 4) = (5, 5)$$

vilket är parallellt med $(1, 1)$.

Ekvivalensklass

Två vektorer sägs vara ekvivalenta om de är lika långa och har samma riktning. Man kan också säga att de tillhör samma ekvivalensklass.




Vektorer ur samma ekvivalensklass.

Ortvektor

Om en *vektor* i ekvivalensklassen har sin början i origo, så har denna vektor samma koordinater som den *punkt* där vektorn slutar, och kallas *ortsvektor*.

Om man i sitt koordinatsystem ritar in en vektor med start i punkten P_1 och slut i punkten P_2 kan man kalla denna vektor $\overrightarrow{P_1P_2}$. Koordinaterna för vektorn $\overrightarrow{P_1P_2}$ blir $(x_2 - x_1, y_2 - y_1)$ om $P_1 = (x_1, y_1)$ och $P_2 = (x_2, y_2)$, dvs. **slutpunktens** koordinater **minus startpunktens** koordinater.



I figuren inses även att

$$\overrightarrow{P_1P_2} = \overrightarrow{OP_2} - \overrightarrow{OP_1}$$

Exempel 2

Punkterna P_1 och P_2 har koordinaterna $(3, 4)$ respektive $(5, 3)$. Bestäm koordinaterna för vektorerna $\overrightarrow{OP_1}$, $\overrightarrow{P_1P_2}$ och $\overrightarrow{P_2P_1}$.

Lösning

$\overrightarrow{OP_1}$ är vektorn som går mellan origo och punkten P_1 och vektorns koordinater är naturligtvis $(3, 4)$

$$\overrightarrow{P_1P_2} = (5 - 3, 3 - 4) = (2, -1)$$

$$\overrightarrow{P_2P_1} = (3 - 5, 4 - 3) = (-2, 1)$$

Exempel 3

Punkterna Q_1 och Q_2 har koordinaterna $(1, 1)$ respektive $(3, 0)$.

- Skriv vektorerna $\overrightarrow{OQ_1}$ och $\overrightarrow{OQ_2}$ med hjälp av basvektorerna \vec{e}_x och \vec{e}_y .
- Skriv även vektorn $\overrightarrow{Q_1Q_2}$ med hjälp av basvektorerna \vec{e}_x och \vec{e}_y .
Bestäm även koordinaterna för vektorn $\overrightarrow{Q_1Q_2}$.
- Vektorn $\overrightarrow{Q_1Q_2}$ är ekvivalent med av vektorerna i Exempel 2.
Vilken och Varför?
- Ortsvektorn i denna ekvivalensklass startar i origo och slutar i en punkt.
Vilken punkt?
- En annan vektor i denna ekvivalensklass slutar i punkten R_2 som har koordinaterna $(-3, -2)$. Vad är koordinaterna för startpunkten R_1 ?

Lösning

- $\overrightarrow{OQ_1} = 1\vec{e}_x + 1\vec{e}_y$ och $\overrightarrow{OQ_2} = 3\vec{e}_x$
- $\overrightarrow{Q_1Q_2} = \overrightarrow{OQ_2} - \overrightarrow{OQ_1} = 3\vec{e}_x - (1\vec{e}_x + 1\vec{e}_y) = 2\vec{e}_x - 1\vec{e}_y = (2, -1)$
Svar: $\overrightarrow{Q_1Q_2} = 2\vec{e}_x - 1\vec{e}_y = (2, -1)$
- $\overrightarrow{P_1P_2}$ har samma längd och riktning som $\overrightarrow{Q_1Q_2}$ eftersom vektorernas koordinater är samma.
Svar: $\overrightarrow{P_1P_2}$
- En vektor som börjar i origo och slutar i punkten $(2, -1)$ har samma längd och riktning som $\overrightarrow{Q_1Q_2}$
Svar: $(2, -1)$
- Vi söker koordinaterna till vektorn $\overrightarrow{OR_1} = (R_{1x}, R_{1y})$.
Vi löser därför ekvationen $\overrightarrow{OR_2} - \overrightarrow{OR_1} = (2, -1)$

$$(-3, -2) - (R_{1x}, R_{1y}) = (2, -1)$$

$$(R_{1x}, R_{1y}) = (-3, -2) - (2, -1)$$

$$(R_{1x}, R_{1y}) = (-5, -1)$$
Ortsvektorn $\overrightarrow{OR_1}$ börjar i origo och slutar i punkten R_1
Svar: Punkten R_1 har koordinaterna $(-5, -1)$.


Vektorlängd

I många tillämpningar är det viktigt att kunna beräkna en vektors längd. Om man har angett vektors koordinater i ON-bas blir detta väldigt enkelt. Längden av en vektor kallas ofta också för beloppet. Längden av vektorn \vec{u} , eller beloppet, skrivs $|\vec{u}|$. Längden av en vektor är ett reellt tal kopplat till vektorn.

I en ON-bas är $|\vec{u}| = \sqrt{x^2 + y^2}$ om koordinaterna för \vec{u} är (x, y) .

Exempel 3 Vektor $\vec{u} = (3, 2)$ är given. Beräkna $|\vec{2u}|$.

$$\begin{aligned}\vec{2u} &= 2(3, 2) = (6, 4) \\ |\vec{2u}| &= \sqrt{6^2 + 4^2} = \sqrt{36 + 16} = \sqrt{52} \text{ le} \\ \text{Svar: } &\sqrt{52} \text{ le}\end{aligned}$$



301. Låt $\vec{u} = (1, 4)$ och $\vec{v} = (2, -2)$. Beräkna i koordinatform
- $3\vec{u}$
 - $\vec{u} - 2\vec{v}$
 - $-\vec{u} + 3\vec{v}$
 - $\vec{u} - \frac{3}{2}\vec{v}$
302. Rita vektorn $\vec{u} = (6, -2)$ samt skriv den med hjälp av basvektorerna \vec{e}_x och \vec{e}_y
303. Vektorn $\vec{u} = (-2, 5)$ och $\vec{v} = (1, 4)$ är givna. Beräkna
- $|\vec{u}|$
 - $|2\vec{u} - 3\vec{v}|$
304. Vektorerna $\vec{u} = (0, 4)$ och $\vec{v} = (-4, 3)$ är givna. Beräkna
- $3|\vec{v}|$
 - $|2\vec{u} - 3\vec{v}|$
 - $|\vec{u}| + |\vec{v}|$
 - $|\vec{u} + \vec{v}|$
305. I ett koordinatsystem är en triangel ritad. Hörnen är placerade i punkterna $P = (1, 2)$, $Q = (4, 0)$ och $R = (-1, -1)$. Ange koordinaterna för vektorerna
- \vec{PQ}
 - \vec{QR}
 - \vec{RP}
 - $\vec{PQ} - \vec{PR}$
306. Bestäm vektorn \vec{w} så att den blir motsatt riktad och tre gånger så lång som vektorn $\vec{u} = (6, -2)$.
307. Visa att punkterna $A = (1, 0)$, $B = (4, -2)$ och $C = (6, -10/3)$ ligger på en rät linje genom att beräkna koordinaterna för vektorerna \vec{AB} och \vec{BC} .
308. Bestäm y så att de tre punkterna $(-1, 2)$, $(0, 4)$ och $(3, y)$ ligger på en rät linje.
309. Vektorn $\vec{u} = (7, 4)$, och $\vec{v} = (-2, 1)$ är givna. Bestäm talet t så att vektorn $\vec{u} + t\vec{v}$ blir parallell med vektorn $\vec{w} = (1, 2)$
310. Låt $\vec{u} = (2, -1)$, $\vec{v} = (-2, 4)$ och $\vec{w} = (-5, 7)$. Bestäm de reella talen s och t så att vektorn $s\vec{u} + t\vec{v}$ blir parallell med \vec{w} samt dubbelt så lång.

4 ABSOLUTBELOPP

Definition

Absolutbeloppet av ett reellt tal x definieras av

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{om } x \geq 0 \\ -x, & \text{om } x < 0 \end{cases}$$

Funktionen ger alltid positiva värden: $|x| \geq 0$ för alla x .


Tolkning

Geometriskt kan $|x|$ tolkas som avståndet till origo (avståndet mellan talet x och talet 0 på tallinjen).

$|5| = 5$, ty $5 \geq 0$. Avståndet mellan talet 5 och origo är 5.

$|-3| = -(-3) = 3$, ty $-3 < 0$. Avståndet mellan talet -3 och origo är 3.

Graf $|x|$




Figuren visar grafen till $f(x) = |x|$

Exempel 1

Lös ekvationen $|x| = 3$

Lösning Geo

Både talet 3 och talet -3 befinner sig på avståndet 3 från origo.



Svar: $x_1 = 3$ och $x_2 = -3$


Lösning Def

$\begin{cases} \text{om } x < 0 \text{ blir ekvationen } -(x_1) = 3 \\ \text{om } x \geq 0 \text{ blir ekvationen } x_2 = 3 \end{cases}$
 Svar: $x_1 = -3$ och $x_2 = 3$

Definition $|x - y|$ Av definitionen för $|x|$ följer att

$$|x - y| = \begin{cases} x - y & \text{om } x \geq y \quad (\text{I bilden nedan är } x > y) \\ -(x - y) = y - x & \text{om } x < y \end{cases}$$

Geometriskt kan $|x - y|$ tolkas som avståndet mellan punkterna x och y på tallinjen, eftersom detta avstånd är det samma som avståndet från punkten $x - y$ på tallinjen till 0.



Avståndet mellan talet x och talet y på tallinjen är oberoende av vilket av talen som är störst, ty $|x - y| = |y - x|$.

$|x - y|$ bygger vidare på, och utvidgar, den tidigare definitionen av $|x|$, t.ex. så är $|x| = |x - 0|$ avståndet mellan talet x och origo.

Exempel 2Beräkna uttrycket $|5 - 9|$

Lösning

$$|5 - 9| = |-4| = 4$$

4 är avståndet mellan 5 och 9.

Alt. lösning


$$|5 - 9| = -(5 - 9) = -5 + 9 = 4$$

Exempel 3Lös ekvationen $|x - 2| = 5$

Lösning Geo

Ekvationen $|x - 2| = 5$ tolkar vi som: "Finn de tal x , sådana att avståndet till talet 2 är 5".

Både talet $x_1 = -3$ och $x_2 = 7$ befinner sig på avståndet 5 ifrån talet 2.

Svar: $x_1 = -3$ och $x_2 = 7$


Lösning Def Vi förbereder genom att undersöka när absolutbeloppet blir noll d.v.s. när teckenväxlingen sker: $|x - 2| = 0 \Rightarrow x = 2$. Därefter delas lösningen upp i två fall i tabellen nedan. Absolutbeloppet tas bort med hjälp av definitionen.

	x	2	\rightarrow
Intervall:	$x < 2$		$2 \leq x$
Absolutbelopp:	$ x - 2 = -(x - 2)$		$ x - 2 = (x - 2)$
Ekvationen:	I detta intervall blir ekvationen: $-(x - 2) = 5$ $-x + 2 = 5$ $x = -3$		I detta intervall blir ekvationen: $(x - 2) = 5$ $x = 7$

Svar: $x_1 = -3$ och $x_2 = 7$

Lösning Graf:
(Ej ok på tentamen)

Lösningen erhålles av skärningspunkterna mellan $y_1 = |x - 2|$ och $y_2 = 5$. Se figuren till höger.
Svar: $x_1 = -3$ och $x_2 = 7$



Grafisk lösning till ekvationen $|x - 2| = 5$

Ekvationer
Lösning Geo

I ekvationslösningarna ovan används tre olika metoder. Om ekvationen är "enkel" leder den geometriska tolkningen snabbt till lösningarna.

Lösning Def

Om ekvationerna blir lite svårare behöver man skriva om ekvationen med hjälp av definitionen för absolutbelopp.

Lösning Graf

En rent grafisk lösning kan vara bra för kontroll och förståelse. **OBS!** Avläsning av skärningspunkter i graf är inte tillräcklig som motivering på Basårets tentor.

Exempel 4

Lös ekvationen $|x + 4| = 2$

Lösning Geo

Omskrivning: $|x - (-4)| = 2$
Finn de tal x , sådana att avståndet till talet -4 är 2.
Svar: $x_1 = -2$ och $x_2 = -6$.

Exempel 5 Lös ekvationen $|x + 11| = -6$

Lösning Geo Finn de tal x , sådana att avståndet till talet -11 är -6 .
Svar: Lösning saknas eftersom inga avstånd, inga absolutbelopp, kan vara negativa.

Exempel 6 Beräkna $|3 - 2x| = 7$

Lösning Def Teckenväxlingen sker vid $|3 - 2x| = 0 \Rightarrow x = \frac{3}{2}$
Absolutbeloppen tas bort med hjälp definitionen i de två intervallen:

x	$\frac{3}{2}$	\rightarrow
<i>Intervall:</i>	$x < \frac{3}{2}$	$\frac{3}{2} \leq x$
<i>Absolutbelopp:</i>	$ 3 - 2x = (3 - 2x)$	$ 3 - 2x = -(3 - 2x)$
<i>Ekvationen:</i>	$(3 - 2x) = 7$ $2x = -4$ $x = -2$	$-(3 - 2x) = 7$ $2x = 10$ $x = 5$

Svar: $x_1 = -2$ och $x_2 = 5$

(Kontroll $VL = |3 - 2 \cdot (-2)| = |3 + 4| = |7| = 7 = HL$
 $VL = |3 - 2 \cdot 5| = |3 - 10| = |-7| = 7 = HL$)

Exempel 7 Lös ekvationen $|x + 3| + |2x - 4| = 19$



Lösning Def Teckenväxlingar sker vid
 $|x + 3| = 0 \Rightarrow x = -3$
 $|2x - 4| = 0 \Rightarrow x = 2$.
 Absolutbeloppen tas bort med hjälp definitionen i de tre intervallen:

x	-3	2	\rightarrow
<i>Intervall:</i>	$x < -3$	$-3 \leq x < 2$	$2 \leq x$
<i>Absolutbelopp:</i>	$ x + 3 = -(x + 3)$ $ 2x - 4 = -(2x - 4)$	$ x + 3 = (x + 3)$ $ 2x - 4 = -(2x - 4)$	$ x + 3 = (x + 3)$ $ 2x - 4 = (2x - 4)$
<i>Ekvationen:</i>	$-(x + 3) - (2x - 4) = 19$ $-3x + 1 = 19$ $x = -6$	$(x + 3) - (2x - 4) = 19$ $-x + 7 = 19$ $x = -12$ <u><i>Ej i intervallet!</i></u>	$(x + 3) + (2x - 4) = 19$ $3x - 1 = 19$ $x = \frac{20}{3}$

Svar: $x_1 = -6$, $x_2 = \frac{20}{3}$

Lösning Graf
(Ej ok på
tentamen)

Jämför med den grafiska lösningen. I högra figuren syns den falska roten.



Vilket värde ska konstanten a ha för att ekvationen
 $|x + 3| + |2x - 4| = a$ ska ha exakt en lösning?

Sammanfattning av kapitlet

Som du märkt ovan så består arbetet för att algebraiskt lösa ekvationer som innehåller absolutbelopp av tre steg:

1. Skriva om ekvationerna så de inte längre innehåller absolutbelopp
2. Lösa de nya ekvationerna
3. Sammanfatta giltiga rötter

404. Beräkna genom att ta bort absolutbeloppets tecken.

- a) $|5 - 7|$
- b) $|7 - 5|$
- c) $|4 - a|$
- d) $|2a - 8|$
- e) $|5| + |-7|$
- f) $|5| - |-7|$
- g) $4 + |a|$
- h) $|-8| + |-a|$

405. Lösningen till ekvationen

$$|x - a| = b$$

$$\text{är } x_1 = -1 \text{ och } x_2 = 7$$

Bestäm konstanterna a och b .

406. Lös ekvationen

- a) $|x| = 1$
- b) $|x| = -1$
- c) $|x - 2| = 0$
- d) $|x - 2| = 1$
- e) $|x + 4| - 7 = 0$
- f) $|5 - x| + 3 = 0$

401. Lös ekvationen

- a) $|2x + 5| = 2$
- b) $|7x - 7| = 7$
- c) $|6 - 3x| - 9 = 0$
- d) $4|2x - 1| - 12 = 0$
- e) $3|4 - 3x| + 7 = 25$
- f) $|2(5 - 3x)| - 14 = 0$

402. Lös ekvationen

- a) $2|x| + x = 1$
- b) $|x + 2| + x = 1$
- c) $|x - 3| = 5 - 3x$
- d) $x + |x - 3| = 5$
- e) $|3x + 2| = 4x + 5$
- f) $5|2 - 3x| - 7 = 17x + 3$

403. Lös ekvationen

- a) $|x - 3| = |5 - x|$
- b) $|x - 1| + |x + 2| = 5$
- c) $|x - 7| = |2x - 2|$

5 FORMLER

I Sverige mäter vi temperaturen i grader Celsius ($^{\circ}\text{C}$). I USA används grader Fahrenheit ($^{\circ}\text{F}$).



För att omvandla från grader Fahrenheit till grader Celsius gör man så här:

1. Subtrahera 32 från Fahrenheitgraderna.
2. Dividera med 1,8.
3. Svaret är i grader Celsius.

Formel

I stället för att beskriva detta med ord kan vi göra det med hjälp av en formel.

$$\boxed{\text{Vänsterled VL}} \quad C = \frac{F - 32}{1,8} \quad \boxed{\text{Högerled HL}}$$

En formel är en likhet, där vänstra ledet är en variabel och högra ledet är ett uttryck. Formeln ovan ger oss en regel för hur temperaturen C kan beräknas.

Lösa ut

Om vi löser ut F i denna likhet får vi en formel för att överföra Celsiusgrader C till Fahrenheitgrader F .

$$F = 1,8C + 32$$

Att lösa en variabel ut ur ett uttryck innebär att få den fritt på ena sidan av likhetstecknet och allt annat (även andra variabler) på andra sidan av likhetstecknet.

501. Lös ut variabel som står inom parentes efter formeln.

- a) $3x + 4y - 13 = 0(x)$
 b) $5x - 3y + 14 = 0(y)$
 c) $S = 2\pi rh + 2\pi r^2 (h)$
 d) $L = a + nd - d (d)$

502. Lös ut variabel som står inom parentes efter formeln.

- a) $U = RI (R)$
 b) $F = ma (a)$
 c) $pV = nRT (V)$
 d) $v = \sqrt{2gh} (h)$

503. Lös ut variabel som står inom parentes efter formeln.

- a) $v^2 - v_0^2 = 2as (a)$
 b) $s = v_0t + \frac{at^2}{2} (a)$
 c) $V = V_0(1 + \gamma T) (T)$
 d) $P = \frac{U^2}{R} (U)$

504. Lös ut variabel som står inom parentes efter formeln.

- a) $I = I_0 + Aa^2 (a)$
 b) $d = \sqrt{h(2r + h)} (r)$
 c) $F = \frac{mv^2}{r} (v)$
 d) $V = \frac{\pi d^2 h}{4} (h)$
 e) $f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} (C)$
 f) $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f} (b)$

505. Lös ut I ur sambandet $x = \frac{\omega L^3}{EI}$.

506. Lös ut t ur formeln $f = \frac{\omega}{L^2 t} + P$.

507. Lös ut de positiva storheterna D respektive L ur sambandet

$$v = \frac{\pi D^2}{4} \cdot L.$$

508. Man har sambandet

$$F = G \cdot \frac{Mm}{(R+h)^2}$$

där alla ingående storheter är positiva. Lös ut m, M, G resp h .

509. Då man räknar på en typ av växelströmkrets kommer man fram till sambandet

$$Z^2 = R^2 + \omega^2 L^2$$

där alla storheter är positiva. Lös ut R, L respektive ω .

510. Om man räknar med energi så kan man komma fram till sambandet

$$W = mgh + \frac{mv^2}{2}$$

mellan de positiva storheterna, W, m, g, h och v . Lös ut h, v resp m .

511. Den som sysslar med plan böjning av rak balk får förr eller senare anledning att befatta sig sambandet

$$\sigma_x = \frac{MZ}{I_y} + \frac{N}{A}$$

Lös ut storheterna N, Z resp A .

512. Lös ut h ur formeln

$$v_0^2 = 2gR^2 \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{R+h} \right).$$

513. Lös ut R ur formeln

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}.$$

514. Man har $c > 0$ och $v > 0$. Lös ut v ur formeln $M = \frac{m}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$.

515. Lös ut $C, C > 0$, ur formeln

$$Z = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2}.$$

6 AREA – OCH VOLYMSKALA⁴


Kartor och ritningar är likformiga avbildningar av verkligheten (föremålet).

Exempel 1 Om en karta har skalan (skalfaktorn) 1:20 000, så är

$$\frac{\text{en sträcka på kartan}}{\text{motsvarande sträcka i verkligheten}} = \frac{1}{20\,000}$$

Exempel 2 Om en ritning är gjort i skalan 1:50, så är
en sträcka i verkligheten = 50 × motsvarande sträcka på ritningen

Exempel 3



Den stora cylindern är en likformig avbildning (en förstoring) av den lilla cylindern.

Längdskala $Längdskalan = \frac{\text{en längd i avbildningen}}{\text{motsvarande längd i föremålet}} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$

Areaskala $Areaskalan = \frac{\text{en area i avbildningen}}{\text{motsvarande area i föremålet}} = \frac{\pi 8^2}{\pi 12^2} = \left(\frac{8}{12}\right)^2 = \left(\frac{2}{3}\right)^2$

$$\text{Areaskala} = (\text{längdskala})^2$$

Volymskala $Volymskalan = \frac{\text{avbildningens volym}}{\text{föremålets volym}} = \frac{\pi 8^2 \cdot 6}{\pi 12^2 \cdot 9} = \left(\frac{2}{3}\right)^2 \cdot \frac{2}{3} = \left(\frac{2}{3}\right)^3$

$$\text{Volymskala} = (\text{längdskala})^3$$

Allmänt gäller för likformiga områden och kroppar

Sammanfattning

$$\text{Om längdskalan} = \frac{a}{b} \text{ så är areaskalan } \left(\frac{a}{b}\right)^2 \text{ och volymskalan } \left(\frac{a}{b}\right)^3$$

⁴ Sid 22-25 något omarbetat från: L. Alfredsson, K. Bråting m.fl. (2012), *Matematik 5000 kurs 2c*, Natur & Kultur läromedel, ISBN 978-91-27-42253-7




Kartan ovan är avbildad i skala 1: 2 500 000

Exempel 1

Triangelarna T_1 och T_2 är likformiga.

T_2 är en avbildning av T_1 .



Bestäm

- längdskalan
- areaskalan
- arean A

Lösning:

a) $Längdskalan = 12/8 = 3/2$

b) $Areaskalan = (längdskalan)^2 = (3/2)^2 = 9/4$

c) $Arean = 32 \cdot 9/4 = 72 \text{ cm}^2$

Exempel 2

Två vaser har samma form men olika storlek. Den större vasen är 15 cm hög och har volymen 1000 cm^3 . Den mindre vasen är 9,0 cm hög. Beräkna den mindre vasens volym, $V \text{ cm}^3$.

Lösning:

Den mindre vasen kan ses som en förminskad modell av den större, vilket ger

$$Längdskalan = 9/15 = 3/5$$

$$Volymskalan = V/1000$$

$$V/1000 = (3/5)^3$$

$$V = 216 \text{ cm}^3 \approx 220 \text{ cm}^3$$




Svar: Den mindre vasens volym är 220 cm^3 .

601. Av ett föremål med höjden 4 cm görs en kopia med höjden 1 cm .
Ange


- längdskalan
- areaskalan
- volymaskalan.

602. Trianglarna har olika storlek men samma form. T_2 är en avbildning av T_1 .



Bestäm

- längdskalan
 - areaskalan
 - den mindre triangelns area.
603. Rätblocken är likformiga. Beräkna den okända volymen, V .



604. I den mindre av två likformiga trianglar är en sida 80% av motsvarande sida i den större triangeln.


Vilket är förhållandet mellan den mindre och den större triangelns areor?

605. På en karta i skala $1:4\,000$ uppskattar Bella arean av ett naturreservat till 80 cm^2 . Hur många ha (hektar) är området i verkligheten? ($1\text{ ha} = 1 \cdot 10^4\text{ m}^2$)

606. Vilken längdskala ger en fördubbling av

- arean
- volymen

607. A-formatet är de vanligaste pappersformaten i Europa.



Alla rektanglarna i A-serien är likformiga. A_0 har arean 1 m^2 . A_1 har måtten $594\text{ mm} \times 841\text{ mm}$.

- Den korta sidan på ett A_7 är 74 mm . Vilket mått har långsidan?
- Vilken area har A_2 ?

608. Hur många gånger större blir arean av en figur om alla längdmått i figuren blir


- 2 ggr så långa
- 3 ggr så långa
- 4 ggr så långa?

609. Sverige är ca 157 mil långt och har en total area på $450\,000\text{ km}^2$.

Är det sant att en Sverigekarta i skala $1:1\,000\,000$ får plats på ett A_4 -papper? Motivera ditt svar.

610. Till ett par jeans med byxlängden (innersömmen) 80 cm går det $A\text{ m}^2$ tyg. Med hur många procent bör tygätgången öka, om man syr ett par jeans av samma modell men med en 10% längre innersöm?


611. Ett koniskt glas rymmer 8 cl då det är fylld till bredden.



Hur många centiliter har man druckit då vätskans höjd sjunkit till hälften?

612. Ett rätblock med sidorna a , b och c avbildas med skalan s . Visa att
 a) areaskalan är s^2
 b) volymaskalan är s^3 .

613. Triangeln CDE har lika stor area som parallelltrapetsen $ABDE$.



Bestäm i exakt form kvoten b/a .

ÖVERKURS Mer om absolutbelopp och ekvationer

Lösningar till ekvationer

Vid lösning av ekvationer hittas ibland *inga* lösningar, *någon/några* lösningar eller *oändligt* många lösningar.

A. Lös ekvationen: $2x - 1 = 2 \Leftrightarrow x = \frac{3}{2}$ Svar: $x = \frac{3}{2}$

Utfall A: *en eller flera* lösningar finns.

Utfall A-D

B. Lös ekvationen: $2x + 3x = 3 + 5x \Leftrightarrow 0 = 3$ Svar: Lösning saknas

Utfall B: *ingen* lösning finns.

C. Lös ekvationen: $1 - x + 5 + x = 6 \Leftrightarrow 6 = 6$ Svar: Alla x -värden är OK

Utfall C: *oändligt* antal lösningar finns.

D. Lös ekvationen: $\frac{x^2-4}{x-2} = 1 \Leftrightarrow x^2 - 4 = x - 2 \Leftrightarrow x^2 - x - 2 = 0$

$$\begin{cases} x_1 = -1 \\ x_2 = 2 \end{cases} \text{ ej definierad} \quad \text{Svar: } = -1$$

Utfall D: *falska* lösningar finns.

Följande **fyra** utfall kan alltså förekomma

- A. Finns lösningar i definitionsmängden \Rightarrow OK
- B. Orimligt resultat t.ex. $0 = 3$ \Rightarrow Inga x ingår
- C. Sant resultat t.ex. $6 = 6$ \Rightarrow Alla x ingår
- D. Lösning hittas, men inte i definitionsmängden \Rightarrow Förkasta x

Samtliga utfall A-D kan förekomma i en och samma ekvation om den innehåller flera absolutbelopp (se Exempel 3).

Absolutbelopp Historik

Är absolutbelopp en helt ny funktion eller kan den uttryckas med funktioner du känner till sedan tidigare?

Studera funktionen $f(x) = \sqrt{x^2}$

$$f(5) = \sqrt{5^2} = \sqrt{25} = 5 \quad f(-3) = \sqrt{(-3)^2} = \sqrt{9} = 3 = -(-3)$$

$$\text{D.v.s. } \sqrt{x^2} = \begin{cases} x, & \text{om } x \geq 0 \\ -x, & \text{om } x < 0 \end{cases} \quad \text{Obs: } -x \text{ är ett positivt tal, om } x < 0.$$

$$\sqrt{x^2} = |x|$$

Detta visar att $|x|$ bara är ett nytt sätt att beteckna funktionen $\sqrt{x^2}$

Exempel 1

Lös ekvationen $x^2 = 9$

Lösning Def

$$x^2 = 9 \Leftrightarrow \sqrt{x^2} = \sqrt{9} \Leftrightarrow |x| = 3 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 & \text{om } x \geq 0 \\ -x = 3 & \text{om } x < 0 \end{cases}$$

$$\text{Svar: } x_1 = 3 \text{ och } x_2 = -3$$

Lösning Ma2

$$x^2 = 9 \Leftrightarrow x = \pm\sqrt{9}$$

$$\text{Svar: } x_1 = 3 \text{ och } x_2 = -3$$

Exempel 2

Förenkla uttrycket $\frac{\sqrt{x^2}}{x}$ ($x \neq 0$) (Du frestas väl inte att svara 1?)

Lösning Def

$$\sqrt{x^2} = \begin{cases} x, & \text{om } x \geq 0 \\ -x, & \text{om } x < 0 \end{cases} \Rightarrow \frac{\sqrt{x^2}}{x} = \begin{cases} \frac{x}{x} = 1, & \text{om } x \geq 0 \\ \frac{-x}{x} = -1, & \text{om } x < 0 \end{cases}$$

Detta är en trappstegsfunktion. Rita gärna upp den på räknaren.

Exempel 3

Avslutningsvis en riktigt knepig absolutbeloppsekvation som resulterar i samtliga fyra utfall A-D som beskrevs inledningsvis.

Lös ekvationen:

$$||x| - 2| + |x + 1| = 3$$

Lösning Def

Vi undersöker när de tre absolutbeloppen blir noll d.v.s. när teckenväxlingarna sker

$$|x| = 0 \Rightarrow \underline{x = 0}$$

$$||x| - 2| = 0 \Rightarrow \begin{cases} x - 2 = 0 & \text{om } x \geq 0 \\ -(x) - 2 = 0 & \text{om } x < 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \underline{x = 2} \\ \underline{x = -2} \end{cases}$$

$$|x + 1| = 0 \Rightarrow \underline{x = -1}$$

Absolutbeloppen ersätts enligt definitionen i de fem intervallen:

x	-2	-1	0	2	
Intervall	$x < -2$	$-2 \leq x < -1$	$-1 \leq x < 0$	$0 \leq x < 2$	$2 \leq x$
Absolutbelopp $ x $		$-(x)$		(x)	
$ x - 2 $	$-(x) - 2$	$-(-(x) - 2)$		$-((x) - 2)$	$((x) - 2)$
$ x + 1 $	$-(x + 1)$		$(x + 1)$		
Ekvationen	$-x - 2 - x - 1 = 3$ $\underline{x = -3}$	$2 - x + x + 1 = 3$ $1 = 3$ <i>Lösningar saknas i intervallet!</i>	$x + 2 + x + 1 = 3$ $x = 0$ <i>Ej i intervallet!</i>	$2 - x + x + 1 = 3$ $3 = 3$ <i>Alla x-värden i intervallet</i>	$x - 2 + x + 1 = 3$ $\underline{x = 2}$
	(A)	(B)	(D)	(C)	(A)

Svar: $\begin{cases} x = -3 \\ 0 \leq x \leq 2 \end{cases}$

Ö.1 Lös ekvationen

$$|x^2 - 5x + 6| = -2x + \frac{19}{4}$$

Ö.2 Lös ekvationen

a) $||x + 1| - |x|| = |1 - x|$

b) $||x + 1| - 2| + 3| = 4$

FACIT

1

101. Symbolen \Leftrightarrow ska stå i rutorna i a), b) och e).
Symbolen \Rightarrow ska stå i rutorna c), d) och f).

102.


- a) T ex: $x = 4$
- b) T ex: Vinkeln är trubbig.
- c) T ex: $ABCD$ är en fyrhörning.
- d) T ex: $x = \pm 5$
- e) T ex: Polygonen är en femhörning.
- f) T ex: x är ett negativt tal.
- g) T ex: Djuret kan simma.
- h) T ex: Siffersumman i heltalet a är delbar med 3.

2

201.
$$\begin{cases} x = 2 \\ y = -1 \end{cases}$$

Ledtråd: Avläs skärningspunkten.

202. a)



b)
$$\begin{cases} x = 2 \\ y = 1 \end{cases}$$


203.

a)
$$\begin{cases} y = 3x \\ y = 4 - x \end{cases}$$


b)
$$\begin{cases} x = 1 \\ y = 3 \end{cases}$$

204.

a) $x = 2/3$ och $y = 5/3$



b) $x = 1,8$ och $y = 0,4$



205.

a)
$$\begin{cases} x = 5 \\ y = 20 \end{cases}$$

Ledtråd:

Ersätt y med $4x$ i den andra ekvationen.

b)
$$\begin{cases} x = 6 \\ y = 4 \end{cases}$$

206.

a) $x = 8 - 5y$

b) $y = 7x - 3$

c) $y = z/2 + 1/2$

d) $x = 5 - 3y$

207.

a)
$$\begin{cases} x = 2 \\ y = 4 \end{cases}$$

b)
$$\begin{cases} x = 3 \\ z = -2 \end{cases}$$

c)
$$\begin{cases} x = 2 \\ y = 1 \end{cases}$$

d)
$$\begin{cases} x = -2 \\ y = 4 \end{cases}$$

Ledtråd c):

Börja med att lösa ut x i den första ekvationen.

208.

a)
$$\begin{cases} 4x + y = 38 \\ 3x + 2y = 46 \end{cases}$$

x är priset på en banan och y är priset på en macka.

b) En banan kostar 6 kr.

c) En macka kostar 14 kr.

209.

$x = 1/5$

Kontroll:

$$HL = 3 \cdot \frac{1}{5} + 1 = \frac{3}{5} + \frac{5}{5} = \frac{8}{5} = VL$$

$$HL = 3 - 7 \cdot \frac{1}{5} + 1 = \frac{15}{5} - \frac{7}{5} + \frac{5}{5} = \frac{8}{5} = VL$$

210.

a)
$$\begin{cases} 2x + 4y = 59 \\ 3x + 3y = 63 \end{cases}$$

x är priset på en kopp kaffe och y är priset på en bulle.

b) En kopp kaffe kostar 12,50.

c) En bulle kostar 8,50 kr.

211.

a)
$$\begin{cases} x = 3 \\ y = 4 \end{cases}$$

b)
$$\begin{cases} x = -5/2 \\ y = -1/6 \end{cases}$$

212.

$a = 12$

Ledtråd:

Bestäm värdet på $5x + 4y$ om $5x + 4y - 3 = 9$

213.

$(1/2, 2), (-2, -3), (2, -1)$

214.

Ja, alla linjer går genom punkten $(14, 25)$.

215.

$a = 3, b = 1$

Ledtråd:

Sätt in $x = 7$ och $y = 2$.

Lös ekvationssystemet i a och b

216.

$$\begin{aligned} \text{a)} & \begin{cases} a = 4 \\ b = 17 \end{cases} \\ \text{b)} & \begin{cases} y = 4 \\ z = 2 \end{cases} \end{aligned}$$

Ledtråd: Börja med att addera ledvis.

217.

$$\begin{aligned} \text{a)} & -3 \\ \text{b)} & \begin{cases} x = 19 \\ y = 4 \end{cases} \end{aligned}$$

Ledtråd:

Lös ekvationssystemet

$$\begin{cases} 3x + 2y = 65 \\ -3x + 15y = 3 \end{cases}$$

218.

$$\begin{aligned} \text{a)} & \begin{cases} x = 2 \\ y = 9 \end{cases} \\ \text{b)} & \begin{cases} a = 1 \\ b = 1 \end{cases} \end{aligned}$$

219. Text

- a) Ekvation 1 med 3 och ekvation 2 med -5 .
b) Ekvation 1 med 6 och ekvation 2 med 4.

220.

$$\begin{aligned} \text{a)} & \begin{cases} s = 67 \\ t = -25 \end{cases} \\ \text{b)} & \begin{cases} x = -5 \\ y = 1/4 \end{cases} \\ \text{c)} & \begin{cases} y = 10 \\ z = 6 \end{cases} \end{aligned}$$

221.

$$\begin{cases} s = 8 \\ t = 2 \end{cases}$$

Ledtråd:

Ekvationssystemet

$$\begin{cases} 8x + 4y = 3 \\ 2x - 8y = -3,75 \end{cases}$$

ger $x = 1/8$ och $y = 1/2$.

222.

$$\begin{cases} x = 1 \\ y = -1 \end{cases}$$

Ledtråd:

Börja med att multiplicera ekvationerna med någon gemensam nämnare.

223.

$$\begin{aligned} \text{a)} & \begin{cases} x = 4,5 \\ y = 3 \end{cases} \\ \text{b)} & \begin{cases} a = -0,03 \\ b = 30 \end{cases} \end{aligned}$$

224. En back pantas för 21,4 kr och ett tomglas för 0,70 kr.

Ledtråd:

Lös ekvationssystemet

$$\begin{cases} 3x + 60y = 106,20 \\ x + 14y = 31,20 \end{cases}$$

225. Det tillverkas 10 traditionella bumeranger och 30 exklusiva bumeranger.

Ledtråd:

Lös ekvationssystemet

$$\begin{cases} 3T + 4E = 150 \\ T + 3E = 100 \end{cases}$$

226.

$$k = 5$$

227. Ekvationssystemet saknar lösning eftersom linjerna saknar skärningspunkt. Linjerna är parallella.

228.

$$\text{a)} k = 2/3$$

*Ledtråd:*Bestäm lutningen på L_2

$$\text{b)} (3, -1)$$

$$\text{c)} k = -1 \text{ och } m = 2$$

Ledtråd:

Ekvationssystemet har oändligt många lösningar eftersom ekvationerna beskriver samma linje.

229. Om $b \neq 3$ finns en enda lösning till ekvationssystemet.*Motivering:*

Linjerna är inte parallella.

Om $b = 3$ och $a \neq -7$ saknas lösning.*Motivering:*

Linjerna är parallella men inte identiska.

Om $b = 3$ och $a = -7$ finns oändligt många lösningar.*Motivering:*

Ekvationerna är identiska.

230.

a) Saknar lösning.

Grafisk tolkning: Ingen skärningspunkt.

b) Lösning:

$$\begin{cases} x = 2 \\ y = 1 \end{cases}$$

Grafisk tolkning: En skärningspunkt.

c) Lösning:

Alla (x, y) för vilka $2x - y = 3$ *Grafisk tolkning:* Alla punkter är gemensamma.

d) Saknar lösning.

Grafisk tolkning: Ingen skärningspunkt.

231.

$$\text{a)} \text{ Text } y = -2/3x + 1$$

Ledtråd: $2x + 3y = 5$ kan skrivas

$$y = -2/3x + 5/3$$


$$\text{b)} \text{ Text } 4x + 6y = 10$$

232.

$$\text{a)} k = -0,5$$

$$\text{b)} k \neq -0,5$$

$$\text{c)} k > -1/3$$

*Ledtråd:*Då $k = -1/3$ hamnar skärningspunkten på x -axeln.233. $a \neq 3$ 234. $a = 33$ ger $x = 49/3 \approx 16,3$ och $y = -44$ $a = 33,1$ ger $x = 98$ och $y = -269,4$

Linjerna är nästan parallella.


*Ledtråd:*Jämför deras k -värden.

3

301.

- a) (3, 12)
 b) (-3, 8)
 c) (5, -10)
 d) (-2, 7)

302.



$$\vec{u} = 6\vec{e}_x - 2\vec{e}_y$$

303.

- a) $\sqrt{29}$
 b) $\sqrt{53}$

304.

- a) 15
 b) $\sqrt{145}$
 c) 9
 d) $\sqrt{65}$

305.

- a) (3, -2)
 b) (-5, -1)
 c) (2, 3)
 d) (5, 1)

306. $\vec{w} = (-18, 6) \quad (\vec{w} = -3\vec{u})$

307. $\vec{u} = \vec{AB} = (3, -2), \vec{v} = \vec{BC} = (2, -4/3)$

$$\vec{v} = \frac{2}{3}\vec{u} \Rightarrow \vec{u} \parallel \vec{v} \Rightarrow \vec{AB} \parallel \vec{BC}$$

Vilket innebär att A, B och C ligger på en rätt linje.

308. $y = 10$

309. $t = 2$

310. $s = -2, t = 3$

4

401.

- a) 2
 b) 2
 c) $\begin{cases} 4 - a & \text{om } a \leq 4 \\ a - 4 & \text{om } a > 4 \end{cases}$
 d) $\begin{cases} 2a - 8 & \text{om } a \geq 4 \\ 8 - 2a & \text{om } a < 4 \end{cases}$
 e) 12
 f) -2
 g) $\begin{cases} 4 + a & \text{om } a \geq 0 \\ 4 - a & \text{om } a < 0 \end{cases}$
 h) $\begin{cases} 8 + a & \text{om } a \geq 0 \\ 8 - a & \text{om } a < 0 \end{cases}$

402. $a = 3$ och $b = 4$

403.

- a) $x = \pm 1$
 b) Lösning saknas
 c) $x = 2$
 d) $x_1 = 1$ och $x_2 = 3$
 e) $x_1 = -11$ och $x_2 = 3$
 f) Lösning saknas

404.

- a) $x_1 = -\frac{7}{2}$ och $x_2 = -\frac{3}{2}$
 b) $x_1 = 0$ och $x_2 = 2$
 c) $x_1 = -1$ och $x_2 = 5$
 d) $x_1 = -1$ och $x_2 = 2$
 e) $x_1 = -\frac{2}{3}$ och $x_2 = \frac{10}{3}$
 f) $x_1 = -\frac{2}{3}$ och $x_2 = 4$

405.

- a) $x_1 = -1$ och $x_2 = \frac{1}{3}$
 b) $x = -\frac{1}{2}$
 c) $x = 1$
 d) $x = 4$
 e) $x = -1$
 f) $x = 0$

406.

- a) $x = 4$
 b) $x_1 = -3$ och $x_2 = 2$
 c) $x_1 = -5$ och $x_2 = 3$

5

501.

- a) $x = (13 - 4y)/3$
 b) $y = (5x + 4)/3$
 c) $h = \frac{S}{2\pi r} - r$
 d) $d = (L - a)/(n - 1)$

502.

- a) $R = U/I$
 b) $a = F/m$
 c) $V = nRT/p$
 d) $h = v^2/2g$

503.

- a) $a = (v^2 - v_0^2)/2s$
 b) $a = (2s - 2v_0t)/t^2$
 c) $T = (V - V_0)/\gamma V_0$
 d) $U = \sqrt{PR}$

504.

- a) $a = \sqrt{(I - I_0)/A}$
 b) $r = (d^2 - h^2)/2h$
 c) $v = \sqrt{Fr/m}$
 d) $h = 4V/\pi d^2$
 e) $C = 1/4\pi^2 f^2 L$
 f) $b = fa/(a - f)$

505. $I = \omega L^3 / XE$

506. $t = \omega / L^2 (f - P)$

507. $D = 2\sqrt{v/\pi L}$
 $L = 4v/\pi D^2$

508. $m = F(R + h)^2 / GM$
 $M = F(R + h)^2 / Gm$
 $G = F(R + h)^2 / Mm$
 $h = \sqrt{GMm/F} - R$

509. $R = \sqrt{Z^2 - \omega^2 L^2}$
 $L = \sqrt{(Z^2 - R^2)/\omega^2}$
 $\omega = \sqrt{(Z^2 - R^2)/L^2}$

510. $h = W/mg - v^2/2g$
 $v = \sqrt{2(W - mgh)/m}$
 $m = 2W/(2gh + v^2)$

511. $N = A(I_y \sigma_x - MZ) / I_y$
 $Z = I_y(\sigma_x A - N) / MA$
 $A = NI_y / (I_y \sigma_x - MZ)$

512. $h = Rv_0^2 / (2gR - v_0^2)$

513. $R = R_1 R_2 R_3 / (R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1)$

514. $c\sqrt{1 - (m/M)^2}$

515. $C = 1/\omega(\omega L \pm \sqrt{Z^2 - R^2})$

Om $\omega L > \sqrt{Z^2 - R^2}$ så får man två lösningar.**6**

601.

- a) $1/4$
Ledtråd: kopian längd/föremålets längd
 b) $1/16$
Ledtråd: $(1/4)^2$
 c) $1/64$

Ledtråd: $(1/4)^3$

602.

- a) $3/4$
Ledtråd: Skalan brukar anges med heltal.
 b) $9/14$
 c) $6,8 \text{ cm}^2$ (6,75)

603. 160 cm^3 604. Förhållandet är 16/25 eller den mindre arean är 64 % av den större arean.
Ledtråd: 80 % kan skrivas 4/5.

605. 13 hektar (12,8)

606.

- a) Längdskala = $\sqrt{2}$
 b) Längdskala = $\sqrt[3]{2}$

607.

- a) 105 mm
 b) $0,25 \text{ m}^2$

608.

- a) 4
 b) 9
 c) 16

609. Nej.

Motivering:
Kartbilden av Sverige är 157 cm lång.

610. 21 %

Ledtråd:
Längdskalan = 1,1

611. 7 cl

Ledtråd: Volymskalan = $(1/2)^3$

612.

- a) Rätblockens area
 $A_1 = 2ab + 2ac + 2bc$
 Bildens area:
 $A_2 = 2 \cdot as \cdot bs + 2 \cdot as \cdot cs + 2 \cdot bs \cdot cs =$
 $= s^2(2ab + 2ac + 2bc)$
 $A_2 = s^2 \cdot A_1$
 b) Rätblockens volym:
 $V_1 = abc$
 Bildens volym:
 $V_2 = as \cdot bs \cdot cs = s^3 \cdot abc$

613. $b/a = \sqrt{2} - 1$ **ÖVERKURS**

Ö.1

- a) $x_1 = 0$ och $x_2 = 2$
 b) $x_1 = -4$, $x_2 = -2$,
 $x_3 = 0$ och $x_4 = 2$

Ö.2

$x_1 = \frac{1}{2}$ och $x_2 = \frac{7-\sqrt{6}}{2}$