



KTH Teknikvetenskap

**SF1626 Flervariabelanalys**  
**Lösningförslag till Kontrollskrivning 2**  
**Tisdagen den 10 april 2012**

(1) Beräkna dubbelintegralen

$$\iint_D \sqrt{1-x^2-y^2} dx dy,$$

där  $D$  är den cirkelsektor som beskrivs av olikheterna  $x^2 + y^2 \leq 1$ ,  $y \geq 0$  och  $x + y \geq 0$ .  
**(4 p)**

LÖSNINGSFÖRSLAG

Vi byter till polära koordinater,  $x = r \cos \varphi$ ,  $y = r \sin \varphi$ , där  $0 \leq r \leq 1$  och  $0 \leq \varphi \leq 3\pi/4$ , och får

$$\begin{aligned} \iint_D \sqrt{1-x^2-y^2} dx dy &= \int_0^1 \left( \int_0^{3\pi/4} \sqrt{1-r^2} r d\varphi \right) dr \\ &= \frac{3\pi}{4} \int_0^1 \sqrt{1-r^2} r dr \\ &= \frac{3\pi}{4} \left[ -\frac{1}{3}(1-r^2)^{3/2} \right]_0^1 \\ &= \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

- (2) Låt  $f(x, y) = y^3 - x^2 - 7y^2 + 2xy + 9y$ .
- A. Bestäm de kritiska (stationära) punkterna till  $f$ . **(1 p)**
- B. Bestäm, för var och en av de kritiska punkterna från uppgift A, Taylorpolyomet av grad 2 till  $f$  kring punkten. **(2 p)**
- C. Avgör de kritiska punkternas karaktär (lokalt min/lokalt max/sadel). **(1 p)**

### LÖSNINGSFÖRSLAG

Vi deriverar partiellt och får  $\partial f/\partial x = -2x + 2y$  och  $\partial f/\partial y = 3y^2 - 14y + 2x + 9$ . Kritiska punkter fås då samtliga partiella derivator är noll. Att  $\partial f/\partial x = 0$  är ekvivalent med att  $y = x$  och insättning av detta i  $\partial f/\partial y = 3y^2 - 14y + 2x + 9 = 0$  ger  $3x^2 - 12x + 9 = 0$  med lösningar  $x = 1$  och  $x = 3$ . Vi får alltså två kritiska punkter, dvs  $(1, 1)$  och  $(3, 3)$ .

För att bestämma karaktären på de kritiska punkterna ska vi ta med andra ordningens termer i Taylorutvecklingen av  $f$  kring de båda punkterna. Vi får  $\partial^2 f/\partial x^2 = -2$ ,  $\partial^2 f/\partial x\partial y = 2$ ,  $\partial^2 f/\partial y^2 = 6y - 14$ .

Kring  $(1, 1)$  har  $f$  andra gradens Taylorpolynom:

$$p_{1,1}(x, y) = 4 + \frac{1}{2}(-2(x-1)^2 + 4(x-1)(y-1) - 8(y-1)^2),$$

där andragradstermerna avgör karaktären. Dvs med  $x-1 = h$  och  $y-1 = k$  ska vi studera  $Q(h, k) = -2h^2 + 4hk - 8k^2$ . Med hjälp av kvadratkomplettering ser vi att  $Q(h, k) = -2((h-k)^2 + 3k^2)$  vilket är en negativt definit kvadratisk form - alltså är punkten  $(1, 1)$  en lokal maxpunkt.

Kring  $(3, 3)$  har  $f$  andra gradens Taylorpolynom:

$$p_{3,3}(x, y) = \frac{1}{2}(-2(x-3)^2 + 4(x-3)(y-3) + 4(y-3)^2),$$

där andragradstermerna avgör karaktären. Dvs med  $x-3 = h$  och  $y-3 = k$  ska vi i detta fall studera  $Q(h, k) = -2h^2 + 4hk + 4k^2$ . Med hjälp av kvadratkomplettering ser vi att  $Q(h, k) = -2((h-k)^2 - 3k^2)$  vilket är en indefinit kvadratisk form - alltså är punkten  $(3, 3)$  en sadelpunkt.

Funktionen  $f$  har alltså exakt en lokal extrempunkt, en lokal maxpunkt i  $(1, 1)$ .

(3) Inom nationalekonomi används ibland en funktion av typen

$$F(L, K) = AL^\alpha K^\beta,$$

för att beskriva hur produktionen  $F$  beror på arbete,  $L$ , och kapital,  $K$ . Funktionen kallas Cobb-Douglas produktionsfunktion och  $A$ ,  $\alpha$  och  $\beta$  är konstanter. Anta att  $\alpha = \beta = 1/2$  och att proportionalitetskonstanten  $A = 1$ . Anta vidare att budgetbegränsningar tillsammans kostnader för arbete och kapital gör att  $K$  och  $L$ , förutom att vara icke-negativa, också måste uppfylla villkoret  $45L + 15K = 270$ . Bestäm de värden på  $K$  och  $L$  som maximerar produktionen under dessa betingelser. **(4 p)**

#### LÖSNINGSFÖRSLAG

Vi ska maximera  $F(L, K) = L^{1/2}K^{1/2}$  under bivillkoret  $G(L, K) = 45L + 15K = 270$ , där  $L, K \geq 0$ . Eftersom  $F$  är kontinuerlig på den kompakta mängd som  $(L, K)$  varierar i måste  $F$  anta ett största värde. Detta kan antas antingen i någon av linjesegmentets ändpunkter  $(0, 18)$  och  $(6, 0)$  eller i någon punkt där  $L > 0$  och  $K > 0$  och bivillkoret är uppfyllt. I en sådan optimal punkt måste  $\nabla F$  och  $\nabla G$  vara parallella, enligt Lagranges sats, eftersom  $F$  och  $G$  båda är  $C^1$ . Detta villkor ger att

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{2}L^{-1/2}K^{1/2} \\ \frac{1}{2}L^{1/2}K^{-1/2} \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 45 \\ 15 \end{pmatrix}$$

vilket ger att  $\lambda = \sqrt{K/L}/90 = \sqrt{L/K}/30$  som medför att  $K^2 = 9L^2$  och därmed  $K = 3L$ , eftersom båda är positiva. Insättning av detta i bivillkoret ger nu att  $L = 3$  och alltså också att  $K = 9$ . Vi jämför värdena i de aktuella punkterna och ser att den maximala produktionen är  $F(3, 9) = 3^{1/2}9^{1/2} = 3\sqrt{3}$ . De värden på  $L$  och  $K$  som maximerar produktionen är alltså  $L = 3$  och  $K = 9$ .

#### Svar:

(1)  $\pi/4$

(2) A.  $(1, 1)$  och  $(3, 3)$

B.  $p_{1,1}(x, y) = 4 + \frac{1}{2}(-2(x-1)^2 + 4(x-1)(y-1) - 8(y-1)^2)$ , och

$p_{3,3}(x, y) = \frac{1}{2}(-2(x-1)^2 + 4(x-1)(y-1) + 4(y-1)^2)$ .

C.  $(1, 1)$  är en lokal maxpunkt och  $(3, 3)$  är en sadelpunkt.

(3)  $L = 3$  och  $K = 9$ .