

## Workshop om decimalbråksrepresentation av reella tal

Denna övning syftar till att du ska förstå vad det innebär att skriva ett reellt tal i form av ett decimaltal, med eventuellt oändlig decimalbråksutveckling. Du kommer också att studera hur decimalbråksutvecklingar för rationella tal och irrationella tal skiljer sig åt.

### 1. ÄNDLIGA DECIMALBRÅKSUTVECKLINGAR REPRESENTERAR RATIONELLA TAL

**Uppgift 1.** Förklara varför ett reelt tal som kan skrivas med *ändligt* många decimaler alltid är ett rationellt tal. Illustrera genom att skriva följande tal på formen  $\frac{p}{q}$ ,  $p, q \in \mathbb{Z}$ ,  $q \neq 0$ .

- (a) 512.43      (b) 0.3456      (c) 3.14      (d)  $-11.11$

Observera också att den ändliga decimalutvecklingen anger talets position på tallinjen exakt.

**Uppgift 2.** Det finns som du säkert vet rationella tal som inte kan skrivas med ändligt många decimaler. Kanske kan du redan ett exempel på det?

**Uppgift 3.** Irrationella tal kan inte skrivas exakt med ändligt många decimaler, det följer av första uppgiften. Hur då? Förklara!

Vi kan sammanfatta det vi har kommit fram till så här långt på följande sätt.

talet  $r$  har ändlig decimalbråksutveckling  $\implies r$  är rationellt.

Observera att implikationen bara går åt ena hållet.

### 2. OÄNDLIGA DECIMALBRÅKSUTVECKLINGAR

Om alla reella tal ska kunna skrivas som decimalutvecklingar tycks vi behöva kunna använda oss av oändliga decimalbråksutvecklingar. Men vad ska vi mena det?

Betrakta decimalbråksutvecklingen  $t = 0.222\dots$  där punkterna skall antyda att det i själva verket är en oändlig rad med tvåor. Ett sätt tolka detta är som följer.

- Från de två första decimalerna utläser vi att  $0.2 \leq t \leq 0.3$ , dvs  $t$  ligger i intervallet  $I_1$  med ändpunkter 0.2 och 0.3.
- Från de tre första decimalerna utläser vi att  $0.22 \leq t \leq 0.23$ , dvs  $t$  ligger i intervallet  $I_2$  med ändpunkter 0.22 och 0.23.

Observera intervallet  $I_2$  ligger inuti intervallet  $I_1$ .

**Uppgift 4.** Fortsätt denna process i ytterligare två steg, dvs ange intervall  $I_3$  och  $I_4$  med rationella ändpunkter som innehåller  $t$  och som är sådana  $I_4$  ligger i  $I_3$  som i sin tur ligger i  $I_2$ . Rita också en bild som illustrerar detta.

Genom att fortsätta denna process kan vi med hjälp av rationella tal precisera var på talaxeln  $t$  ligger med så stor noggrannhet vi önskar. Vi kan alltså tänka på  $t$  som en punkt på tallinjen, dvs det vi vill mena med ett reellt tal.

**Uppgift 5.** Övertyga nu dig själv om att vi kan göra denna tolkning av *varje* oändlig decimalbråksutveckling. Exemplifiera genom att ange en följd av fem krympande intervall med rationella ändpunkter som succesivt ger alltmer precis information om var talet  $\pi$  ligger.

**Uppgift 6.** Talet  $\sqrt{5}$  är ett irrationellt tal, det kan man visa med samma typ av bevis som visar att  $\sqrt{2}$  är irrationellt. Vi ska nu bestämma början av decimalbråksutvecklingen av  $\sqrt{5}$ . Först konstaterar vi att  $2 \leq \sqrt{5} \leq 3$  eftersom  $4 \leq 5 \leq 9$ , så  $\sqrt{5} = 2.\dots$

- Visa nu att  $2.2 \leq \sqrt{5} \leq 2.3$ .
- Bestäm genom provning först ett intervall av längd 1/100 som innehåller  $\sqrt{5}$ , och sedan ett av längd 1/1000 och slutligen ett av längd 1/10000. Intervallen ska ha rationella ändpunkter, och varje intervall ska vara innehållit i de tidigare.  
Använd din räknare för beräkningarna (men inte  $\sqrt{\quad}$ -knappen!).
- Ange ett närmevärde till  $\sqrt{5}$ .

Genom att fortsätta processen kan vi bestämma  $\sqrt{5}$  med önskad noggrannhet.

**Kommentar.** En matematiskt precis definition av vad ett icke-rationellt reellt tal är, kan göras genom att *definiera* icke-rationella tal som följder av krympande intervall med rationella ändpunkter, där varje intervall skall vara inneslutet i de tidigare. I denna konstruktion är det väsentligt att man använder *slutna* intervall, dvs intervall som innehåller sina ändpunkter. Man måste också beakta att det finns många olika följder av intervall som leder fram till ett och samma tal, vilket man kan förstå till exempel genom att upprepa de konstruktioner vi har använt ovan men använda någon annan bas än bas tio.

### 3. RATIONELLA TAL ÄR PRECIS DE TAL SOM HAR ÄNDLIG ELLER PERIODISK DECIMALUTVECKLING

Du ska nu i två steg bevisa att rationella tal är precis de tal som har ändlig eller periodisk decimalutveckling.

Med *periodisk* utveckling menar vi att decimalutvecklingen efter ett tag består av en upprepning av en viss följd av decimaler, som t ex  $0.333\dots$ ,  $1.023777\dots$  (där vi tänker oss att resten av utvecklingen består av sjuor) eller  $0.0236236236\dots$  (där följden 236 upprepas i det oändliga).

Vi kan betrakta ändliga utvecklingar som periodiska genom att fylla på med en oändlig rad av nollor, t ex  $0.57 = 0.57000\dots$

**Uppgift 7.** Visa först att varje rationellt tal har en periodisk decimalbråksutveckling:

- Bestäm decimalbråksutvecklingen av några rationella tal, t ex  $\frac{2}{5}$ ,  $\frac{1}{6}$  och  $\frac{4}{7}$  genom utföra divisionerna för hand tills du ser mönstret i decimalutvecklingen. Förklara varför du kan vara säker på att mönstret kommer att upprepa sig.

Be din lärare om hjälp om du har svårt att genomföra divisionerna för hand på ett bra sätt. Enklast är att ställa upp divisionen i "trappan".

- Förklara, utifrån de exempel du just genomfört, varför varje rationellt tal kommer att ha en periodisk decimalbråksutveckling.

Nästa steg blir att bevisa det omvända påståendet, dvs att varje periodisk decimalbråksutveckling representerar ett rationellt tal.

Börja med att studera talet  $r = 0.777\dots$ . Om vi multiplicerar talet  $r$  med 10 får vi talet  $10r = 7.777\dots$  och bildar vi sedan differensen  $10r - r$  ser man att

$$10r - r = 7.777\dots - 0.777\dots \iff 9r = 7.000\dots \iff r = \frac{7}{9},$$

så speciellt är  $r$  ett rationellt tal.

**Uppgift 8.**

- Genomför samma typ av resonemang för talet  $s = 1.343434\dots$  genom att bilda differensen  $100s - s$ . (Varför använder vi faktorn 100 denna gång?)
- Förklara varför denna typ av resonemang kan genomföras för varje periodisk decimalbråksutveckling. Kan du formulera detta generellt på ett precist matematiskt språk?

4. ETT ANNAT SÄTT ATT SE ATT PERIODISKA UTVECKLINGAR  
REPRESENTERAR RATIONELLA TAL

Låt oss återvända till talet  $0.222\dots$ . En decimalbråksutveckling är ju ett tal uttryckt i positionssystemet med bas tio, så per definition gäller att

$$0.222\dots = \frac{2}{10} + \frac{2}{10^2} + \frac{2}{10^3} + \dots = \sum_{k=1}^{\infty} 2 \left( \frac{1}{10} \right)^k.$$

Vi känner igen högerledet som en geometisk serie med första term  $\frac{2}{10}$  och kvot  $\frac{1}{10}$ , vars summa vi kan beräkna till

$$\sum_{k=1}^{\infty} 2 \left( \frac{1}{10} \right)^k = \frac{2}{10} \left( \frac{1}{1 - \frac{1}{10}} \right) = \frac{\frac{2}{10}}{\frac{9}{10}} = \frac{2}{9}.$$

Så vi ser även på detta sätt att den periodiska decimalutvecklingen  $0.222\dots$  representerar ett rationellt tal.

**Uppgift 9.** Genomför samma typ av resonemang för talen  $0.333\dots$  och  $0.151515\dots$ .

I *What is Mathematics?* på sidan 67 formuleras i genrell termer hur man på detta vis bevisar att varje periodiskt decimalbråk representerar ett rationellt tal.

5. ÄR  $0.999\dots$  OCH  $1.000\dots$  SAMMA TAL?

**Uppgift 10.** Som avslutning på denna workshop, avgör om  $0.999\dots$  och  $1.000\dots$  är samma tal.

Kan du generalisera detta till andra par av decimalbråksutvecklingar?